

かぜのひきはじめに

# 改源かぜカプセル

第②類医薬品

のどの痛み・発熱・頭痛

## 特徴

- かぜのひきはじめののどの痛みや発熱、頭痛などの症状に効くかぜ薬です。
- かぜの諸症状に効く洋薬成分に加えて、3種類の生薬成分（カンゾウ末、ケイヒ末、ショウキョウ末）が自己治癒力を高め、体の回復を助けます。
- 眠くなる成分（抗ヒスタミン剤）が入っていない非ピリン系のかぜ薬です。
- 7歳のお子様から服用できます。
- 服用しやすく、携帯しやすいカプセルタイプです。



## 使用上の注意

### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
  - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください  
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬
3. 服用前後は飲酒しないでください
4. 長期連用しないでください



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 授乳中の人。
  - (4) 高齢者。
  - (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (6) 次の症状のある人。  
高熱
  - (7) 次の診断を受けた人。  
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
* 腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をすときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。

3. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 効能・効果

かぜの諸症状（のどの痛み、発熱、頭痛、せき、たん、悪寒、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

## 用法・用量

次の1回量を1日3回、食後なるべく30分以内に服用してください。

年齢	15才以上	7才以上15才未満	7才未満
1回量	2カプセル	1カプセル	服用させないでください

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) カプセルの取り出し方：右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。  
(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



## 成分・分量

6カプセル中に次の成分を含んでいます。

成分	含量	作用
アセトアミノフェン	900mg	熱を下げ、頭痛、関節の痛みなどをやわらげます。
dL-メチルエフェドリン塩酸塩	40mg	せきをしずめ、のどを楽にします。
無水カフェイン	75mg	頭痛をやわらげます。
カンゾウ末	200mg	せきをしずめ、たんを出しやすくします。
ケイヒ末	150mg	頭痛をやわらげ、熱を下げます。
ショウキョウ末	135mg	せきをしずめます。

これらの生薬成分は、自己治癒力を高め、体の回復を助けます。

○添加物としてセルロース、ステアリン酸Mg、ラウリル硫酸Na、黄色5号、ゼラチン含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) 外箱に表示の使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、または下記にお願い申し上げます。  
カイゲンファーマ株式会社 お客様相談室 電話 06-6202-8911  
受付時間：9：00～17：00（土曜、日曜、祝日を除く）

**カイゲンファーマ株式会社** 大阪市中央区道修町二丁目5番14号