

立ちくらみ



だるさ



疲れ



クラッとする
貧血に



朝起きづらい等の症状を伴う貧血に



思春期のお嬢様・
産前産後の貧血に

第2類医薬品

貧血用薬

第2類医薬品

貧血用薬

マスチゲン[®]-S錠

MASTIGEN[®] S TABLET

お客様相談窓口 ☎06・6222・0441
土・日・祝日を除く 9:00~17:00
副作用被害救済制度 ☎0120・149・931

マスチゲン[®]-S錠

MASTIGEN[®] S TABLET

この添付文書は、ご使用前に必ずお読み下さい。
また、必要時に読めるよう保管しておいて下さい。
平成24年10月改訂

製造販売元 日本臓器製薬株式会社
大阪市中央区平野町2丁目1番2号
®登録商標



特長

1. 1日2錠飲めば、毎日食事からとる必要のある鉄分の2倍以上の鉄分23mgを補給できます。
2. 体内での吸収がよい鉄分配合により、クラツとする貧血を治します。
3. 烏レバー128gまたは、ホウレン草580g中に含まれる鉄分と同量の鉄分11.5mgを1錠中に配合しています。
4. 2～3週間の服用で、貧血が原因の立ちくらみ・だるさ・疲れ・朝の起きづらさ・手足の冷えに効き始めます。
5. 鉄分の吸収を高めるレモン1個分のビタミンC25mg・赤血球を守るビタミンE、カルシウム・葉酸・ビタミンB₁₂配合。
6. 思春期のお嬢様・産前産後の貧血に有効です。

使用上の注意

してはいけないこと

守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。本剤を服用している間は、他の貧血薬を服用しないで下さい。

相談すること

1. 次の人は服用前に医師・薬剤師・登録販売者にご相談下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用が考えられますので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師・薬剤師・登録販売者にご相談下さい。

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹痛

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合は、服用を中止し、この添付文書を持って医師・薬剤師・登録販売者にご相談下さい。
便秘、下痢
4. 3週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師・薬剤師・登録販売者にご相談下さい。

【成分】1錠中

フマル酸第一鉄 35mg(鉄として11.5mg) ビタミンC 25mg ビタミンE酢酸エステル 5mg リン酸水素カルシウム 25mg 葉酸 0.5mg ビタミンB₁₂ 5μg ビタミンB₆ 硝酸塩 5mg ビタミンB₂ 1mg ビタミンB₃ 0.5mg ニコチン酸アミド 3mg 硫酸コバルト 0.05mg 硫酸銅 0.5mg

添加物

炭酸カルシウム、セルロース、N(レシシデン)ン、デキストリン、乳糖、ゼラチン、タルク、無水ケイ酸水合物、無水ケイ酸、白蠟、ステアリン酸Mg、ヒマシ油、メタケイ酸アルミン酸Mg、カルナウ(1)ロウ、酸化チタン、アラビアゴム、セラック、赤色102号

【成分に関連する注意】

配合されているフマル酸第一鉄により便秘になったり便が黒くなる場合があります。

【効能】

貧血

こんな時に...

クラツとする貧血に



立ちくらみ



だるさ



疲れ



朝起きづらい等の症状を伴う貧血に



思春期のお嬢様・産前産後の貧血に

【用法・用量】 成人(15歳以上) 1回1錠、1日2回、食後に服用して下さい。

用法・用量に関連する注意 1. 貧血症状が少しでも改善された方は、その後も根拠よく服用して下さい。詳しくは、薬剤師・登録販売者にご相談下さい。2. 3週間ほど服用されても症状が改善しない場合、他に原因があるか、他の疾患が考えられます。服用を中止し、医師・薬剤師・登録販売者にご相談下さい。3. 本剤の服用前後30分は、玉露・煎茶・コーヒー・紅茶は飲まないで下さい。ほうじ茶・番茶・ウーロン茶・玄米茶・麦茶はさしつかえありません。4. 授乳中のマスチゲンS錠の服用は全く問題ありません。赤ちゃん・お母さんとマスチゲンS錠に含まれる鉄分やビタミンは大事な栄養素です。5. 妊娠3週目まではマスチゲンS錠の服用は問題ありません。4週目から15週目はおなかの赤ちゃんにすりの影響が出やすい期間とされていますので、医師・薬剤師・登録販売者にご相談下さい。16週から出産まではマスチゲンS錠の服用は問題ありません。

【保管および取扱上の注意】 1. 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しいところに密栓して保管して下さい。冷蔵庫での保管はさけて下さい。急な温度変化は錠剤表面に水分を発生させ変色の原因になります。2. 小児の手の届かないところに保管して下さい。3. 他の容器に入れかえないで下さい。誤飲の原因になったり品質が変わるおそれがあります。4. 水分が錠剤につくと表面の糖衣の一部が溶け、白く変色することがあります。誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触らないで下さい。ぬれた錠剤を元の容器に戻しますと、他の錠剤に悪影響を及ぼしますのでご注意ください。5. 輸送中の錠剤破損防止のため、容器内に透明ビニールを入れてあります。開栓後はお捨て下さい。6. 落下により錠剤がカクたりすることがあります。7. 容器内に乾燥剤が入っています。誤って服用しないで下さい。

4種類からお選び下さい

<p>お試し用 32錠 16日分</p> <p>携帯に便利な ジューズ包装</p> 	<p>60錠 30日分</p> 	<p>120錠 60日分</p> <p>お使用 容量です。</p> 	<p>240錠 120日分</p> <p>お使用 容量です。</p> 
---	---	--	---

甘さをひかえたイチゴ味のマスチゲンS内服液もございます。

【第2類医薬品】
妊娠・産後・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患などの場合の栄養補給C滋養強壮C滋養特長

特長

1. 1日2錠飲めば、毎日食事からとる必要のある鉄分の2倍以上の鉄分23mgを補給できます。
2. 体内での吸収がよい鉄分配合により、クラツとする貧血を治します。
3. 烏レバー128gまたは、ホウレン草580g中に含まれる鉄分と同量の鉄分11.5mgを1錠中に配合しています。
4. 2～3週間の服用で、貧血が原因の立ちくらみ・だるさ・疲れ・朝の起きづらさ・手足の冷えに効き始めます。
5. 鉄分の吸収を高めるレモン1個分のビタミンC25mg・赤血球を守るビタミンE、カルシウム・葉酸・ビタミンB₁₂配合。
6. 思春期のお嬢様・産前産後の貧血に有効です。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。
本剤を服用している間は、他の貧血薬を服用しないで下さい。

相談すること

1. 次の人は服用前に医師・薬剤師・登録販売者にご相談下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用が考えられますので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師・薬剤師・登録販売者にご相談下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹痛

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合は、服用を中止し、この添付文書を持って医師・薬剤師・登録販売者にご相談下さい。
便秘、下痢
4. 3週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師・薬剤師・登録販売者にご相談下さい。

【成分】1錠中

フマル酸第一鉄 35mg(鉄として11.5mg) ビタミンC 25mg ビタミンE酢酸エステル 5mg リン酸水素カルシウム 25mg 葉酸 0.5mg ビタミンB₁₂ 5μg ビタミンB₇硝酸塩 5mg ビタミンB₆ 1mg ビタミンB₉ 0.5mg ニコチン酸アミド 3mg 硫酸コバルト 0.05mg 硫酸銅 0.5mg

添加物

炭酸カルシウム、セルロース、パレロイシヨダンブ、デキストリン、乳糖、ゼラチン、タルク、無水ケイ酸水合物、無水ケイ酸、白糖、ステアリン酸Mg、ヒマシ油、メタケイ酸アルミン酸Mg、カルナバウロウ、酸化チタン、アラビヤゴム、セラック、赤色102号

【成分に関連する注意】

配合されているフマル酸第一鉄により便秘になったり便が黒くなることがあります。

【効能】

貧血

こんな時に...

クラツとする貧血に



立ちくらみ



だるさ



疲れ



朝起きづらい等の症状を伴う貧血に



思春期のお嬢様・産前産後の貧血に

【用法・用量】成人(15歳以上) 1回1錠、1日2回、食後に服用して下さい。

用法・用量に関連する注意 1. 貧血症状が少しでも改善された方は、その後も継続よく服用して下さい。詳しくは、薬剤師・登録販売者にご相談下さい。2. 3週間ほど服用されても症状が改善しない場合、他に原因があるか、他の疾患が増えられます。服用を中止し、医師・薬剤師・登録販売者にご相談下さい。3. 本剤の服用前後30分は、玉露・煎茶・コーヒー・紅茶は飲まないで下さい。ほうじ茶・番茶・ウーロン茶・玄米茶・麦茶はさしつかえありません。4. 授乳中のマスチゲンS錠の服用は全く問題ありません。赤ちゃん・お母さんともマスチゲンS錠に含まれる鉄分やビタミンは大事な栄養素です。5. 妊娠3週目まではマスチゲンS錠の服用は問題ありません。4週目から15週目はおなかの赤ちゃんにくすりの影響が出やすい期間とされていますので、医師・薬剤師・登録販売者にご相談下さい。16週から出産まではマスチゲンS錠の服用は問題ありません。6. 錠剤の取り出し方：右図のように錠剤の入っているシート包装の凸部を指先で押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出して下さい。誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。



【保管および取扱い上の注意】 1. シート包装のアルミ袋開封後は、お早めに服用して下さい。2. シート包装から錠剤を取り出されたら、すぐに服用して下さい。3. 直射日光を避け、なるべく湿度の少ない涼しいところに保管して下さい。冷蔵庫での保管はさけて下さい。急な温度変化は錠剤表面に水分を発生させ変色の原因になります。4. 小児の手の届かないところに保管して下さい。5. 他の容器に入れかえないで下さい。誤飲の原因になったり品質が変わるおそれがあります。6. 落下により錠剤がカケたりすることがあります。7. シート包装のアルミ袋内には乾燥剤が入っています。誤って服用しないで下さい。

4種類からお選び下さい

60錠
30日分

120錠
60日分

お徳用
容量です。

240錠
120日分

お徳用
容量です。

甘さをひかえたイチゴ味のマスチゲンS内服液もございます。

【第2類医薬品】

胎毒・肉体的疲労・妊娠初期・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性海熱性疾患などの場合の栄養補助に効果的です。



< 32錠 シート包装の添付文書 >