

疲れ・だるさ、
授乳期の栄養補給

マスチゲン® S内服液 50mL

MASTIGEN®-S DRINK

鉄分・カルシウム
ビタミンB₂・B₆ 配合

第2類医薬品 脂肪分ゼロ

甘さひかえめ
イチゴ味



第2類医薬品

マスチゲン®-S内服液

使用上の注意 相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談して下さい。

(1) 今までに薬によるアレルギー症状(例えば発熱、発疹、ぜんそく、かゆみ等)を起こしたことがある人。

(2) 医師の治療をうけている人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この商品をもって医師または薬剤師に相談して下さい。

(1) 本剤の服用により胃部不快感、下痢、発疹等の症状があらわれた場合。

(2) 1ヵ月位服用しても症状の改善がみられない場合。

【効能】

○肉体的疲労・妊娠授乳期・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患などの場合の栄養補給○滋養強壮○虚弱体質

【用法・用量】

大人(15歳以上) 1日1回1本

(50mL)を服用して下さい。
服用に際して次のことに注意して下さい。

(1) 15歳未満の小児には服用させないで下さい。

使用期限

(2) 定められた用法及び用量を厳守して下さい。

【成分】

1本50mL (31キロカロリー) 中
クエン酸鉄アンモニウム…20mg
(鉄として3mg)

グルコン酸カルシウム…1000mg

ビタミンB₂リン酸エステル…3mg

ビタミンB₆ ……25mg

タウリン ……800mg

L-アスパラギン酸カリウム…100mg

L-アスパラギン酸マグネシウム…100mg

ニコチン酸アミド…30mg

無水カフェイン…50mg

添加物:アルコール0.05mL以下、

液糖(白糖・果糖・ブドウ糖)、クエン酸水和物、L-リンゴ酸、カラメル、安息香酸Na、パラベン、香料
鉄味をまれに感じることがあります。

【保管及び取り扱い上の注意】

(1) 小児の手のとどかない所に保管して下さい。(2) キップで手を切らないようにご注意ください。(3) 高温・直射日光をさけ、涼しい所に保管して下さい。凍結させないで下さい。(4) 他の容器に入れかえないで下さい。

販売 日本臓器製薬株式会社

大阪市中央区平野町2丁目1番2号

お客様相談窓口 ☎06-6222-0441

土・日・祝日を除く 9:00~17:00

製造販売元 大同薬品工業株式会社

奈良県葛城市新村214番地1

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造番号

®登録商標

D08JD

50mL



4