

この添付文書は、本剤のご使用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

フェルゼア

かゆみを伴う乾燥肌治療薬

第2類医薬品

尿素20%+かゆみ止め成分配合

フェルゼアDX20クリーム N


フェルゼアDX20クリーム Nの特長

- 空気が乾燥していると肌も乾燥してカサカサになり、かゆみを伴うことがあります。フェルゼアDX20クリーム Nは尿素20%と2種類のかゆみ止め成分（ジフェンヒドラミン、リドカイン）配合により、がまんできないかゆみを抑え、カサカサ肌をしっとりさせる効果があります。
- スーッとしてべたつかない、しっとりすべすべクリームです。

こんなかゆい乾燥肌によく効きます



お風呂上がり
や就寝中など
に体が温まっ
てかゆい時



すねなどの皮
ふ表面が白く
粉をふいてか
ゆい時



衣類などの刺
激でかゆい時

入浴後や就寝前のご使用がおすすめです。

⚠使用上の注意

☒ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

次の部位には使用しないこと

- (1) 目のまわり、粘膜等。
- (2) 引っかき傷等のきずぐち、亀裂（ひびわれ）部位。
- (3) かさぶたの様に皮ふがはがれているところ。
- (4) 炎症部位（ただれ・赤くはれているところ）。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人または家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬や化粧品等による刺激症状またはアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師または薬剤師に相談すること

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、刺激感（痛み、熱感、ぴりぴり感）、はれ、かさぶたの様に皮ふがはがれる状態

(2) 2週間使用しても症状がよくなる場合

【適応症】

かゆみを伴う乾燥性皮膚（成人・老人の乾皮症）

【用法・用量】

1日数回、適量を患部に塗擦してください。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 用法・用量を守ること。
- (2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (3) 小児（15歳未満）には使用させないこと。
- (4) 外用にのみ使用すること。
- (5) 化粧品ではないので、適応症で定められた患部のみに使用し、基礎化粧等の目的で顔面には使用しないこと。

【成分・分量】（1g中）

成 分	分 量	作 用
尿 素	200mg	水分を引き寄せて皮ふをやわらかくします。
ジフェンヒドラミン	10mg	抗ヒスタミン作用により、かゆみをおさえます。
リドカイン	20mg	かゆみの刺激が伝わるのをブロックすることで、かゆみをおさえます。
グリチルリチン酸二カリウム	5mg	炎症をやわらげます。
トコフェロール酢酸エステル （ビタミンE）	5mg	皮ふの血行を促進し、乾燥症状を改善します。

添加物として流動パラフィン、ワセリン、ジメチルポリシロキサン、セタノール、グリセリン、1,3-ブチレングリコール、ステアリン酸、ベヘン酸、ミリスチン酸イソプロピル、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリオキシエチレンベヘニルエーテル、ステアリン酸グリセリン、水酸化Na、クエン酸Na、乳酸、エデト酸Na、パラベン、ヒアルロン酸Na、0-メントール、その他1成分を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 本剤のついた手で、目など粘膜に触れないこと。
- (2) 高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (3) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (4) 他の容器に入れかえないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く使用すること。



お問い合わせ先	
資生堂薬品株式会社	お客さま窓口 電話 03-3573-6673 受付時間 9:30～17:00（土、日、祝日を除く）

発売元 資生堂薬品株式会社
東京都中央区銀座7-5-5

製造販売元 株式会社 資生堂
東京都中央区銀座7-5-5