

フェルゼア レチノバイタル クリーム

第3類医薬品

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の部位には使用しないでください。

- (1) 目のまわり、粘膜等
- (2) 引っかき傷等のきずぐち、亀裂(ひび割れ) 部位
- (3) かさぶたの様に皮膚がはがれているところ
- (4) 炎症部位(ただれ・赤く腫れているところ)



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 薬や化粧品等による刺激症状またはアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、刺激感(痛み、熱感、ぴりぴり感)、かさぶたの様に皮膚がはがれる状態

3. 2週間使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【適応症】 さめ肌、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、老人の乾皮症、手指のあれ

【成分・分量】(1g中)

成 分	分 量	作 用
尿素(ウレア)	200mg	肌のうるおいを保ちます
ビタミンA油(レチノールパルミチン酸エステル)	5mg	肌の代謝を高め、肌をなめらかにします
グリチルリチン酸二カリウム	5mg	肌の炎症を鎮めます
トコフェロール酢酸エステル	20mg	肌の新陳代謝を助けます

添加物として、流動パラフィン、ワセリン、ジメチルポリシロキサン、ベヘニルアルコール、ステアリン酸、ベヘン酸、ミリスチン酸イソプロピル、トリイソオクタン酸グリセリン、グリセリン、1,3-ブチレングリコール、ヒアルロン酸Na、2-メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン・メタクリル酸ブチル共重合体液、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリオキシエチレンベヘニルエーテル、ステアリン酸グリセリン、ジイソプロパノールアミン、クエン酸Na、エドト酸Na、ジブチルヒドロキシトルエン、パラベン、三二酸化鉄、香料、その他1成分を含有します。

【用法・用量】

1日数回、適量を患部にすりこんでください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 小児(15歳未満)には使用させないでください。
- (3) 目に入らないようにご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。
- (5) 化粧品ではありませんので、適応症で定められた患部のみに使用し、基礎化粧品等の目的で顔面には使用しないでください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 本剤のついた手で、目など粘膜に触れないでください。
- (2) 高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (3) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早くご使用ください。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

MADE IN JAPAN

お問い合わせ先

資生堂薬品株式会社 お客さま窓口 電話 03-3573-6673
受付時間 9:30~17:00(土、日、祝日を除く)