

この説明文書はお薬とともに保管し、使用の際にはよくお読み下さい。

説明文書改訂年月
2013年5月
(記載要領変更に伴う改訂)

(E)

おだやかな作用で良く効く便秘薬

妙通[®]
(みょうつう)

第②類医薬品

(便秘薬)

—植物性和漢薬—

おだやかな作用の植物性和漢薬です。気持ちよく便通がつき、便秘による不快な症状もおさ
まります。小つぶの丸剤ですから服用しやすく、症状によって用量も適宜加減できます。

⚠ 使用上の注意

❌ **してはいけないこと** 守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる

- 1 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないで下さい
他の瀉下薬（下剤）
- 2 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい
- 3 大量に服用しないで下さい

必ずお守り下さい



相談すること

- 1 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
①医師の治療を受けている人。
②妊婦又は妊娠していると思われる人。
③薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
④次の症状のある人。
はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
- 2 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
- 3 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
下痢
- 4 1週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

裏面もお読み下さい→

用法・用量

1日2回、朝夕の空腹時（又は食前或いは食間）に服用。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量すること。

年 齢	1 回 量	服用回数
成 人 15 歳以上	10丸～20丸	1日2回
11歳以上15歳未満	6丸～12丸	
7歳以上11歳未満	5丸～10丸	
7歳未満	服用しない✕	

〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
(2) 7歳未満の小児には服用させないで下さい。

効能・効果

便秘、便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振、腹部膨満、腸内異常醗酵^(※)、痔
(※醗酵＝はっこう)




成分・分量

成 分	(40丸中)
アロエ末	0.40g
センナ末	0.84g
ダイオウ末	0.40g
ゲンチアナ末	0.16g
ショウキョウ末 (いずれも日本薬局方医薬品)	0.24g
ケンゴシ末	0.15g

添加物としてトメントール、カルメロースCa、セルロース、ブチルパラベン、ハッカ油、薬用炭、セラックを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- 1 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- 2 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 3 他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- 4 水分が丸剤に付きますと、内容成分の変化の原因となりますので、誤って水滴を落としたり、濡れた手で触れないで下さい。
- 5 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。
- 6 ビンのキャップは湿気などを避けるために使用のつどしっかりしめて下さい。



本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。
明治薬品株式会社お客様相談室
電 話：☎0120-53-3451
受 付 時 間：9:00～17:00（土、日、祝日、特定休日を除く）

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)