

この説明文書はお薬とともに保管し、使用の際にはよくお読み下さい。

説明文書改訂年月
2012年11月

⑤



第3類医薬品

切傷・湿疹・あせも・にきびに



使用上の注意



相談すること

1 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

- ①医師の治療を受けている人。
- ②薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- ③患部が広範囲の人。
- ④湿潤やただれのひどい人。
- ⑤深い傷やひどいやけどの人。
- ⑥患部が粘膜の人。

2 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

用法・用量

適量を患部に塗布或いは塗擦して下さい

〈用法・用量に関連する注意〉

- 1** 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- 2** 目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗して下さい。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。
- 3** 外用にのみ使用して下さい。
※切傷 傷口をきれいな水等で清潔にしてからオゾをぬって下さい。

効能・効果

切傷、湿疹、かぶれ、あせも、かゆみ、ただれ、にきび、靴ずれ、痔、神経痛



(裏面もお読み下さい)

成分・分量

成 分	1g中
アクリノール水和物	0.8mg
サリチル酸メチル	8.0mg
酸化亜鉛	45.0mg
dl-カンフル	55.0mg

添加物として精製ラノリン、ステアリン酸、パラフィン、白色ワセリン、トメントール、ユーカリ油を含有します。

(いずれも日本薬局方医薬品)

保管及び取扱い上の注意

- 1 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- 2 小児の手の届かないところに保管して下さい。
- 3 他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- 4 衣類に付着すると黄色等に着色し、脱色しにくいので注意して下さい。
- 5 使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。
- 6 一度フタをあけた後は、使用期限内でも、なるべく長期の使用はしないで下さい。



本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は
下記にお願い致します。
明治薬品株式会社お客様相談室
電 話：☎0120-53-3451
受 付 時 間：9:00～17:00(土、日、祝日、特定休日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

製造販売元

明治薬品株式会社

富 山 県 富 山 市 三 郷 6 番 地