

2017年11月作成

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

龍角散のせきどめ液

第②類医薬品

鎮咳去痰薬

龍角散のせきどめ液は、せき中枢にはたらいて、せきの発作を抑え気管支をひろげてせきをしすめます。またアレルギー性のせきや、たんを伴うせきにもすぐれた効果をあらわします。夜中の急なせきや、がんこなたんもすばやく抑える、大人1回1本飲みきりのシロップ剤です。

【効能・効果】せき、たん

【用法・用量】大人(15歳以上)1回量10mL(1本)、15歳未満は服用しないこと

通常1日4回毎食後および就寝前に服用すること。
場合により1日6回まで服用しても差し支えないが、
その場合は原則として約4時間の間隔をおいて服用すること。

〈用法・用量に関する注意〉

・用法・用量を厳守してください

お問い合わせ先

本品について何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は、下記までご連絡いただきますようお願い申しあげます。



株式会社
龍角散

[お客様相談室] 東京都千代田区東神田2-5-12
電話 03-3866-1326 時間 10:00~17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元



株式会社
龍角散

千葉県香取郡多古町水戸字水戸台1460番地3
本社所在地：東京都千代田区東神田2-5-12

【成分・分量】

60mL(大人1日量)中

ジヒドロコデインリン酸塩

..... 30mg

dl-メチルエフェドリン塩酸塩

..... 45mg

ノスカピン塩酸塩水和物

..... 45mg

ジプロフィリン

..... 120mg

クロルフェニラミンマレイン酸塩

..... 12mg

無水カフェイン

..... 75mg

グアイフェネシン

..... 225mg

セネガ流エキス

..... 0.9mL

(原生薬換算量

..... 900mg)

添加物

：白糖、サッカリンNa、D-ソルビトール、ク

エン酸、クエン酸Na、パラベン、エタノール、黒糖

フレーバー、エチルバニリン、香料

【保管および取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- 本剤は生薬成分を配合していますので沈殿を生じることがありますが、効力に変わりありません。よく振ってから服用してください。
- キャップの開栓時、手指にケガをしないよう注意してください。

RS00R



使用上の注意

— ✗ してはいけないこと —

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください


他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしてください

(眠気等があらわれることがあります。)

3. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください

4. 過量服用・長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(5) 次の症状のある人。高熱、排尿困難

(6) 次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、てんかん、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持つて医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位

皮膚

消化器

精神神経系

循環器

泌尿器

症 状

発疹・発赤、かゆみ

吐き気・嘔吐、食欲不振

めまい

動悸

排尿困難

症状の名称

症 状

再生不良性貧血

青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白く見える、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。

無顆粒球症

突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

呼吸抑制

息切れ、息苦しさ等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
便秘、口のかわき、眠気

4. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

※モ