


ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

鎮咳去痰薬

# 龍角散

第3類医薬品

意匠登録済  
穴あきさじ

龍角散は、鎮咳去痰作用を活発にする生薬（キキョウ・セネガ・キョウニン・カンゾウ）を主成分としたのどの薬です。

人間の気管の内面には、纖毛細胞が一面にあり、その纖毛は1分間に約1,500回の速さで絶えず振動し、また気管の内壁からは粘液を分泌しています。気道を通って来たチリやホコリ、細菌などはこの粘液にとり込まれ、纖毛の振動によって体外に排出されます。これが自然の浄化作用です。

のどの使いすぎや喫煙、汚れた空気を吸ったりするとのどが炎症を起して痛んだり、たんがからんだりして浄化能力がおとろえ、せきで苦しむことになります。こんなときに龍角散をのむと、キキョウ・セネガの有効成分サポニン配糖体が、気管内面からの粘液の分泌を高め、纖毛運動を活発にして、たんをとり去り、せきを鎮め炎症をやわらげます。

## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(3) 高熱の症状のある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

3. 5～6日服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 【効能・効果】

せき、たん、のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ

## 【用法・用量】


次の量を添付のさじ（山盛り1杯0.3g）で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
大人(15歳以上)	1杯	3～6回
11歳以上15歳未満	2/3杯	
8歳以上11歳未満	1/2杯	
5歳以上8歳未満	1/3杯	
3歳以上5歳未満	1/4杯	
1歳以上3歳未満	1/5杯	
3ヵ月以上1歳未満	1/10杯	
3ヵ月未満	服用しないこと	



●龍角散は直接のどの粘膜に作用して、効果をあらわす薬です。

●必ず水なしで服用してください。

## 龍角散の服用方法



①さじを中ブタから切り離す。②中ブタを開けて。



③さじに山盛りに取って。



④舌の上に薬をおき、ゆっくり溶かすようにしながらのどの方に運んで下さい。

### 〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 2歳未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

## 【成分・分量】

1.8g (大人1日量) 中

成 分	含 量
キキョウ末（去痰作用）	70mg
キョウニン末（咳止め作用）	5.0mg
セネガ末（去痰作用）	3.0mg
カンゾウ末（咳止め作用）	50mg

添加物：炭酸Ca、リン酸水素Ca、炭酸Mg、安息香酸、香料

## 【保管および取り扱い上の注意】

- (1) 使用後は、容器を必ず中ブタで密栓した上で、外ブタで封をしてください（湿気等で品質が変わることがあります）。
- (2) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (3) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

## お問い合わせ先

本品について何かお気づきの点がございましたら、お買い上げのお店又は、下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。



株式会社 龍角散 [お客様相談室] 東京都千代田区東神田2-5-12  
電話 03-3866-1326 時間 10:00～17:00 (土・日・祝日を除く)



株式会社 龍角散

千葉県香取郡多古町水戸字水戸台1460番地  
本社所在地：東京都千代田区東神田2-5-12