


第2類医薬品 殺菌消毒薬

MEDICARE®

メディケア®シリーズ

靴ずれ・すり傷に

【販売名】ダイアジンA軟膏

靴ずれを治す
3つの成分

- ・3つの有効成分の働きにより、靴ずれ・すり傷による痛みや炎症を抑え、殺菌・消毒し、化膿を防ぎます。
- ・塗りやすく携帯に便利なチューブタイプ
- ・クリーム状でのびがよく、べたつきがなく、さっぱりとした塗り薬です。

△使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 患部が広範囲の人
 - (4) 深い傷やひどいやけどの人
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(裏面もお読みください)

効能・効果

靴ずれ、すり傷、切傷、さし傷、かき傷、創傷面の殺菌・消毒

用法・用量

1日数回、適量を患部にすりこむか又は塗布してください。

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 用法を守ってください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。
- (5) 傷口に泥やよごれ等がついている場合は、きれいに洗い落としてください。また、使用の際には手指を清潔にしてください。

成分・分量


(100g中)

成分	含量	はたらき
イソプロピルメチルフェノール	1.0g	殺菌作用により、患部の化膿を防ぎます。
リドカイン	1.5g	局所麻酔作用により、靴ずれ、すり傷の痛みを鎮めます。
l-メントール	2.0g	赤み、はれ等の炎症をおさえます。

添加物としてプロピレングリコール、セタノール、ミリスチン酸イソプロピル、ラウリル硫酸Na、ステアリン酸ソルビタン、パラベン、ステアリン酸グリセリン、ベヘン酸、ヘキシルデカノール、ジメチルポリシロキサン、ステアリン酸ポリオキシシル、ラウロマクロゴールを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。特に高温になるような所(夏の車中など)には絶対に保管しないでください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 表示の期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、表示の期限内であっても開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。



本品のお問い合わせは、お買い求めのお店、または次のところにお問い合わせください。
森下仁丹株式会社「お客様相談室」06-6761-0003
受付時間 平日9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構 ☎0120-149-931
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

発売元 **森下仁丹株式会社**
大阪府中央区玉造1丁目2番40号
<http://www.jintan.co.jp>

製造 **中新薬業株式会社**
販売元 富山県滑川市上小泉504-2