

使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。



湿疹、あせも、皮膚のただれに

非ステロイド性
皮膚疾患治療薬 **コーフルS** (軟膏) チューブ入
第3類医薬品

コーフルSは、すぐれた殺菌力があるアクリノールと、被膜を作り傷口を乾燥させる酸化亜鉛の2つの有効成分に、スクワラン・オリブ油・白色ワセリン・セタノールの基剤を用いた皮膚疾患を治す軟膏です。また、脂胞性基剤を使用しているので傷口からガーゼがはがれやすく、ガーゼ、包帯の交換も痛まずにできます。あかちゃんはもとより、ご家族みなさまの皮膚疾患の手当てにお役立てください。

こんなときに

●乳幼児の



湿疹、あせも、
皮膚のただれ、
肛門周囲炎

●小さな子の



湿疹、あせも、
口唇周囲炎、
すり傷、外傷、

●お母さんの



湿疹、やけど、
くつずれ、乳ぎれ、

●高齢の方の



床ずれ、
皮膚のただれ

●その他

凍傷にも

4つの基剤の特長

スクワラン	深海にすむサメの肝臓から抽出した油で、薬剤の浸透性に優れ皮膚の保護力を高めます。
オリブ油	もくせい科常緑樹オリーブの熟した果実から得られ、皮膚を保護します。
白色ワセリン	外気や物と皮膚が触れないように遮断し水分の蒸散を防ぐので傷の部分を保護します。
セタノール	保湿効果がある親水性の軟膏基剤です。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

飲んだり、眼科用として使用しないでください。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 患部が広範囲の人
- (4) 濡潤やただれのひどい人
- (5) 深い傷やひどいやけどの人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹、発赤、かゆみ、かぶれ等

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

湿疹、汗疱、汗疹(あせも)、皮膚のただれ、床ずれ、肛門周囲炎、口唇周囲炎、臍帶脱落後のただれ、くつずれ、やけど、すり傷、外傷、乳ぎれ、会陰裂傷、凍傷

用法・用量

1日1回～数回、患部に塗布又は貼用する。

●用法・用量に関する注意

- (1) 目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合は眼科医の診察を受けてください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 定められた用法・用量を守ってください。
- (4) 外用にのみ使用してください。

成分(100g中)

成 分	含 量	はたらき
アクリノール	500mg	黄色ブドウ球菌をはじめ、化膿レンサ球菌、その他化膿菌全般による化膿局部の消毒、静菌作用があります。
酸化亜鉛	5000mg	皮膚のたんぱく質と結合して被膜をつくるので、消炎作用、緩和な防腐作用があります。また、浸出液の吸収及び分泌抑制により、創面などを乾燥させます。

添加物として、ビタミンA油、エルゴカルシフェロール、ジパルミチン酸ピリドキシン、トコフェロール、dl-カンフル、スクワラン、オリブ油、白色ワセリン、セタノール及び香料を含有する。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (2) キャップをしっかりと締めて直射日光の当たらない、なるべく涼しい所に保管してください。
- (3) 誤用を避け品質を保持するために他の容器に入れ替えないでください。
- (4) 衣服等に付くと着色しますので、ご使用の際は充分に注意してください。

お問い合わせ先

大木製薬株式会社 お客様相談室 03-3256-5051

受付時間:9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

発売元



大木製薬株式会社
東京都千代田区神田鍛冶町3-3
<http://www.ohkiseiyaku.com>

製造販売元

協和新薬株式会社
埼玉県草加市小山1丁目28番8号

副作用被害救済制度の問い合わせ先
☎0120-149-931(フリーダイヤル)