

●ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要毎に熟めるよう大切に保管してください●

消炎・鎮痛冷感バップ剤

ラクスキットクール

第3類医薬品

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1. 次の部位には使用しないでください

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) しっしん、かぶれ、傷口。

● 取扱すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (2) 薬によりアレルギー症状を経験したことがある人。

2. 次の場合は直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

(2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

効能・効果

頭痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨節痛

用法・用量

患部のプラスチックフィルムをはがし、1回1～2回、患部に貼付してください。

（用法・用量に関する注意）

(1) 定められた用法・用量をお守りください。

(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

(3) 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。

(4) 汗をかいている時は、よくふきとってから貼付ください。

(5) 患部の広さに応じて、フィルムの上から適当な大きさにハサミで切ってご使用ください。

成分・分量 膏価100g中

成分	分量
サリチル酸メチル	0.5g
α-カンフル	0.5g
イメンチール	0.3g

添加物として、ポリビニルアルコール（部分けん化剤）、カルボキシビニルポリマー、ポリアクリル酸部分中和物、CMC-Na、D-ソルビトール、グリセリン、セスキオレイン酸ソルビタン、ポリソルベート80、タイタニウム酸Mg、カオリン、酸化チタン、エデト酸Na、パラベンを含有します。

保管及び取扱い上の注意

(1) 小児の手が届かない所に保管してください。 (2) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(3) 他の容器に入れかえないでください。（薬物の混入に当たり品質が変わることがあります。）

(4) 金属製剤のため、未使用分は紙に入れ、開口部のプラスチックをきちんと閉めて再度にめられないように保管してください。

(5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

製造元

大木製薬株式会社

東京都千代田区神田墨田区3-3

製造販売元

東光薬品工業株式会社

東京都文京区東目黒2-14-23

＜お問い合わせ先＞

本製品に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください（営業時間内のみ対応）。

東光薬品工業株式会社 03-3855-0101

製剤用検査製造課のお問い合わせ先

＜電話＞0120-149-931（フリーダイヤル）



A

製造番号

使用期限

4 987030 195103