

販売名:ソルマックプラス

生薬配合胃腸薬

ソルマック[®]プラス

第2類医薬品



大鵬薬品工業株式会社

東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL.03-3293-4509
<http://www.taiho.co.jp/>

副作用救済制度 TEL 0120-149-931

使用
期限
製造
番号



使用上の注意



してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり副作用が起こりやすくなります) ●長期連用しないで下さい。

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。(1)医師の治療を受けている人 (2)高齢者 (3)むくみのある人 (4)高血圧、腎臓病、心臓病の診断を受けた人 2. 服用後、まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師の診療を受けて下さい。偽アルドステロン症、ミオパチー(手足のたるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。) 3. 5~6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果

はきけ(二日酔・悪酔のむかつき、むかつき、胃のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、消化不良、食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、もたれ(胃もたれ)、胃弱、食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部膨満感、胸やけ、胸つかえ

L1103
25mL
ガラス:瓶
金属:キャップ

用法・用量

成人(15歳以上)、1回1本(25mL)を1日2回服用して下さい。服用間隔は4時間以上おいて下さい。●小児(15歳未満)は服用しないで下さい。●用法・用量を厳守して下さい。●小児(15歳未満)は服用しないで下さい。●用法・用量を厳守して下さい。●小児(15歳未満)は服用しないで下さい。●用法・用量を厳守して下さい。

成分

一日量2本(50mL)中— ウコン流エキス0.3mL、カンゾウ抽出物135mg、ニンジン流エキス0.5mL、オウレンチンキ0.826mL、チョウジチンキ0.126mL、ゲンチアナチンキ0.376mL、ソウジュツ流エキス1.2mL、ケイヒチンキ0.25mL、カルニチン塩化物120mg
添加物:ハチミツ、白糖、アラビアゴム、エデト酸Ca/2Na、l-メントール、アルコール、安息香酸Na、pH調整剤、安息香酸ベンジル、香料(アルコール0.8mL以下/本)●生薬成分を含むため、沈殿を生じることがあるので、よく振ってから服用して下さい。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)開栓後の保存及び他の容器への入れ替えをしないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります)。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

