

第3類医薬品 チオビタドリンクアイビタス

〔使用上の注意〕相談すること

1. 服用後、皮膚に発疹があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。2. 服用後、下痢があらわれることがあるので、下痢の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。3. しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。〔効能・効果〕○滋養強壮○虚弱体

質○肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給〔用法・用量〕成人(15歳以上)1日1回1本(100 mL)を服用して下さい。●小児(15歳未満)は服用しないで下さい。●用法・用量を守って下さい。

100mL

ガラス:瓶
金属:キャップ

滋養強壮・虚弱体質・栄養補給

チオビタ[®]
ドリンク

アイビタス

TIOVITA

第3類医薬品

〔成分(1本100mL中)〕タウリン 1000mg、イノシトール 50mg、ニコチン酸アミド 20mg、チアミン硝化物(ビタミンB₁)10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB₂)15mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆)50mg、カルニチン塩化物120mg、無水カフェイン50mg 添加物:白糖、果糖、ブドウ糖、DL-リンゴ酸、没食子酸プロピル、安息香酸Na、pH調整剤、バニリン、エチルバニリン、香料 ●本剤に配合されているビタミンB₂により、尿が黄色になることがあります。心配ありません。

〔保管及び取扱い上の注意〕(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)開栓後の保存及び他の容器への入れ替えをしないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります)。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

L1102

製造販売元

大鵬薬品工業株式会社

東京都千代田区神田錦町1-27

お客様相談室 TEL.03-3293-4509

<http://www.taiho.co.jp/>

TAIHO

副作用救済制度 TEL 0120-149-931

使用期限

製造番号