

かぜ薬

小児用 新コールドトップ液「プラス」

第②類医薬品

小児用新コールドトップ液「プラス」は、鎮痛、解熱にアセトアミノフェン、せきに3種類の成分、くしゃみ、鼻水に効くマレイン酸クロルフェニラミンを配合。服用しやすいシロップ剤で風邪の症状をやく改善します。

⚠ 使用上の注意

本剤は、小児用ですが、かぜ薬として定められた一般的な注意事項を記載しています。

❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）

1. 次の人は服用しないで下さい

- （1）本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- （2）本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい

（眠気があらわれることがあります）

4. 服用時は飲酒しないで下さい

5. 長期連用しないで下さい



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい

- （1）医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- （2）妊婦又は妊娠していると思われる人。
- （3）授乳中の人。
- （4）高齢者。
- （5）本人又は家族がアレルギー体質の人。
- （6）薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- （7）次の症状のある人。

高熱、排尿困難

（8）次の診断を受けた人。

甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい

（1）服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック （アナフィラキシー）	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 （スティーブス・ジョンソン症候群） 中毒性表皮壊死症 （ライエル症候群）	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）等があらわれる。
間質性肺炎	空せき（たんを伴わないせき）を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。（これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けて下さい。）
ぜんそく	

（2）5～6回服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい

便秘、口のかわき



成分と作用 本品30mL 中

成 分	分 量	作 用
アセトアミノフェン	460mg	熱を下げ、痛みをしずめます。
d-ルース酸メチルエフェドリン	18.75mg	気管支を広げ、呼吸を楽にして、せきをしずめます。
リン酸ジヒドロコデイン	8mg	せき中枢にはたらき、せきをしずめます。
マレイン酸クロルフェニラミン	3.125mg	くしゃみ・鼻水・鼻づまりなどのアレルギー症状をおさえます。
無水カフェイン	37.5mg	頭痛をしずめます。
グアヤコールスルホン酸カリウム	100mg	のどにからんだたんをやわらかくして、出しやすくします。

添加物として、l-メントール、クエン酸、クエン酸Na、白糖、サッカリンNa、ポリドン、安息香酸Na、パラベン、エタノール、カラメル、バニリン、プロピレングリコール、香料を含有します。

効能又は効果

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

			
せき・たん	のどの痛み	鼻水・鼻づまり	発熱・悪寒

用法及び用量

本品に1回量を量り得るコップがついていますからよく振り混ぜてご利用下さい。

年 齢	1回量	用法及び用量
3才以上 7才未満	3mL	1日3回食後および必要な場合には、就寝前に服用するものとし、また場合によっては、1日6回まで服用することとしても差し支えありませんが、1日6回服用する場合には、原則として約4時間の間隔をおいて服用して下さい。
1才以上 3才未満	2mL	
6ヵ月以上 1才未満	1.8mL	
3ヵ月以上6ヵ月未満	1.5mL	
3ヵ月未満	服用しないこと	

<用法及び用量に関連する注意>

- (1) 用法及び用量を厳守して下さい。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- (3) 2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させて下さい。


<かぜの養生法>

感冒にかかった時には症状に応じて適当な手当が必要でしょう。

- ◎空風に当たらない様に。
- ◎休養と栄養を十分に。
- ◎発熱時は必ず休み無理をさけましょう。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。
- (5) いったん開封後は、品質保持の点からなるべく早く服用して下さい。



■お問い合わせ先。

伊丹製薬株式会社 お客様相談室 TEL 0740-22-2059

受付時間：9時から16時30分まで(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度

☎0120-149931



製造販売元

伊丹製薬株式会社

滋賀県高島市今津町下弘部280