

服用に際しては、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

飲みすぎ・胸やけ・胃の不快感に

太田胃散〈分包〉

第2類医薬品



芳香性健胃消化薬

自然(生薬)の良さを生かした胃腸薬



特徴

現代の食生活では、不規則な食事、嗜好品のとり過ぎなど、胃に負担をかけてしまうことが多くなっています。**太田胃散〈分包〉**は、健胃生薬(自然薬物)に制酸剤、消化酵素を配合した現代の食生活にマッチした胃腸薬です。飲みすぎ、胸やけ、胃のもたれなどの不快な症状に、おだやかですぐれた効きめをあらわします。毎日の食生活を快適に過ごしていただけるよう、**太田胃散〈分包〉**をお役立てください。

生薬が胃の働きを改善

七種の健胃生薬の効果的な配合が胃の働きを良好にし、飲みすぎ、食べすぎ、胃のもたれなどの不快な症状の改善に役立ちます。また、胃の弱った方や食欲のない方にも健胃生薬は有効です。

制酸剤が胃酸を中和

作用の異なる制酸剤を配合することで、胃の中の酸度を調整し、胸やけ、胃痛、胃部不快感にすぐれた効果をあらわすとともに、消化酵素を働きやすいようにします。

さわやかな服用感と確かな効きめ

生薬特有の芳香味と効きめを生かすために散剤の形にしています。生薬の芳香味が α -メントールの清涼感、制酸剤の働きと相まってスッキリとした爽快な服用感をもたらします。また散剤なので胃の中で早く作用します。

⚠️ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
透析療法を受けている人。
2. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4) 次の診断を受けた人。
腎臓病
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

(2) 2週間位服用しても症状がよくならない場合

裏面に続きます

効能・効果

飲みすぎ、胸やけ、胃部不快感、胃弱、胃もたれ、食べすぎ、胃痛、消化不良、消化促進、食欲不振、胃酸過多、胃部・腹部膨満感、はきけ(胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、悪心)、嘔吐、胸つかえ、げっぷ、胃重

用法・用量

次の量を食後又は食間に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1包	3回
8～14歳	1/2包	
8歳未満	服用しないこと	

散剤の服用が苦手な方へ

最初に薬を口に含み、次に水を含んで2～3回舌でよくかきまぜるとのみやすくなります。

※食間とは食後2～3時間のことをいいます。

<用法・用量に関連する注意>

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分 1包(1.3g)中

成分	分量	主な作用
健胃生薬 ケイヒ ウイキョウ ニクズク チョウジ チンピ ゲンチアナ ニガキ末	92 mg 24 mg 20 mg 12 mg 22 mg 15 mg 15 mg	各生薬成分の健胃作用により、胃の働きを良好にします。また生薬の持つ独特の芳香や苦味などが、胃の運動を活発にし胃液の分泌を調整します。
制酸剤 炭酸水素ナトリウム 沈降炭酸カルシウム 炭酸マグネシウム 合成ケイ酸アルミニウム	625 mg 133 mg 26 mg 273.4 mg	速効性、持続性、遅効性などの作用の異なる各制酸剤が、胃の中の酸度を効果的に調整します。
消化酵素 ビオジアスターゼ	40 mg	主にでんぷんやたん白質などの消化を助ける複合消化酵素です。

[添加物] l-メントール

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

包装 16包・32包・48包

- ・ **太田胃散**は分包の他に、缶入り(75g・140g・210g)もあります。
- ・ この他、下記の姉妹品があります。目的に合わせてご利用ください。
胃のもたれ・食べすぎに小粒でのみやすい**太田胃散A<錠剤>**
ストレスによる神経性胃炎・慢性胃炎に**太田漢方胃腸薬Ⅱ<散剤・錠剤タイプ>**があります)

製品のお問い合わせ先

株式会社 太田胃散「お客様相談係」
☎(03) 3944-1311(代表)
受付時間 9:30～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元



株式会社 太田胃散
東京都文京区千石 2-3-2
<http://www.ohta-isan.co.jp/>