

表面

第2類医薬品

服用に際しては、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

芳香性健胃消化薬 **太田胃散**

⚠ 使用上の注意

- ⊗ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります) 1. 透析療法を受けている人は服用しないでください 2. 長期連用しないでください
- ⊗ **相談すること** 1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください (1) 医師の治療を受けている人。(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4) 腎臓病の診断を受けた人。2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください (1) 服用後、皮ふに発疹・発赤、かゆみの症状があらわれた場合。(2) 2週間位服用しても症状がよくなる場合。

■ **効能・効果** 飲みすぎ、胸やけ、胃部不快感、胃弱、胃もたれ、食べすぎ、胃痛、消化不良、消化促進、食欲不振、

裏面

胃酸過多、胃部・腹部膨満感、はきけ(胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、悪心)、嘔吐、胸つかえ、げっぷ、胃重

■ **用法・用量** 成人(15歳以上)1回1.3g、8~14歳

1回0.65g、1日3回食後又は食間に服用してください。

(添付のさじはすり切り1杯で約1.3gです。中ぶた裏のすり切り板をご使用ください。食間とは食後2~3時間のことをいいます。) <用法・用量に関連する注意> 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

■ **成分** (1.3g中) ケイヒ92mg、ウイキョウ24mg、ニクズク20mg、チョウジ12mg、チンピ22mg、ゲンチアナ15mg、ニガキ末15mg、炭酸水素ナトリウム625mg、沈降炭酸カルシウム133mg、炭酸マグネシウム26mg、合成ケイ酸アルミニウム273.4mg、ビオチンアスターゼ40mg〔添加物〕 l-メントール

■ **保管及び取扱い上の注意** (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

<製品のお問い合わせ先> お客様相談係 (03) 3944-1311
受付時間 9:30~17:00 (土、日、祝日を除く)



株式会社 太田胃散
東京都文京区千石 2-3-2