

服用に際しては、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

水なしで服用できる 胃腸薬

第3類医薬品

太田胃散チュアブルNEO

胸やけ・胃の膨満感・胃の不快感に



使用上の注意

相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 次の診断を受けた人。
腎臓病
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って
医師又は薬剤師に相談してください
2週間位服用しても症状がよくならない場合。
- 次の症状があらわれることがあるので、このような症
状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、
医師又は薬剤師に相談してください。
便秘、下痢

効能・効果

胸やけ、胃部膨満感、胃部不快感、胃痛、胃酸過多、胃もたれ、
胃重、飲みすぎ、はきけ(胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、
悪心)、胸つかえ、げっぷ、嘔吐

特徴

- ◆太田胃散チュアブルNEOは、水がなくても服用できるチュアブルタイプの胃腸薬です。外出先、車の中、オフィスなど、どこでも手軽に服用することができます。
- ◆出すぎた胃酸が原因で起こる胸やけ、胃の不快感、胃の痛みによく効きます。また、胃の中にたまったガスを取り除くことで胃の膨満感を抑えます。
- ◆メントールの効いたさわやかなレモンライム味で、スッキリ爽やかな服用感です。

用法・用量

次の量をかみくだくか、口の中でとがして服用してください。
服用間隔は4時間以上おいてください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2錠	3回
15歳未満	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

●錠剤の取り出し方

右図のように、錠剤の入っているPTPシート
の凸部を指先で強く押して裏面のアル
ミ箔を破り、取り出して服用してください。

〔誤ってそのまま飲み込んだりすると、
食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事
故につながります。〕



裏面に続きます

成分 1日量(6錠)中

制酸剤

- 水酸化マグネシウム……600mg
- 炭酸マグネシウム……600mg
- 沈降炭酸カルシウム……960mg

作用の異なる各制酸剤が、出すぎた胃酸を効果的に中和することで、胃の不快な症状を抑えます。

消泡剤

- ジメチルポリシロキサン……120mg

胃の中の気泡となったガスを取り除くことで、胃のハリを抑えます。

(添加物) l-メントール、ヒドロキシプロピルセルロース、香料、銅クロロフリンNa、ステアリン酸Mg、セルロース、粉末還元麦芽糖水アメ、キシリトール

【日常生活での注意点】

薬に頼るだけでなく、日常生活にも注意しましょう。

- ◆ストレスをためない
- ◆十分な睡眠をとる
- ◆規則的な食事を心がける
- ◆飲みすぎない

胸やけ
胃の膨満感
胃の不快感
の時に…

成人

1回2錠

かみくだくが、
口の中であかして
服用する



有効成分がじわじわと
食道を通して胃に広がり、
効果的に作用します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 錠剤の斑点は成分によるもので、品質には問題ありません。
- (5) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。
なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く服用してください。

包装 18錠(6錠入りPTP×3枚)

製品のお問い合わせ先

株式会社 太田胃散「お客様相談係」

☎(03)3944-1311(代表)

受付時間 9:30~17:00(土、日、祝日を除く)

発売元



株式会社 太田胃散
東京都文京区千石2-3-2
<http://www.ohta-isan.co.jp/>

製造
販売元



明治薬品株式会社
富山県富山市三郷6番地