

第3類医薬品

日本薬局方
希ヨードチンキ
50mL
開栓注意

2012年1月(記載要領変更に伴う改訂)

本剤の使用前に、この外箱の説明事項を必ずお読みください。また、必要なとき読めるよう大切に保管してください。

△【使用上の注意】

【してはいけないこと】
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起らやすくなる)
次の人は使用しないこと

(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起したことがある人

【相談すること】

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1)医師の治療を受けている人 (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことのある人 (3)腹部が広範囲の人 (4)深い疲れやひどいやけの人の
2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【関係部位 症状】

皮膚 発疹、発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起ることがある。
その場合は直ちに医師の診療を受けること

【症状の名称 症状】

アナフラキシー 使用後に、皮膚の痛み(じましん)、声のかすれなどの現象

【3~5日間使用してて症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること】

【効能・効果】

創傷面の殺菌、消毒

【用法・用量】

適量を1日数回患部に塗布する。
(用法・用量に関する注意)

(1)定められた用法・用量を厳守すること (2)本剤は外用のみで使用し、内服用としては使用しないこと (3)目に入らないように注意すること (4)万一、目にに入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること (5)口唇等の粘膜の部分、口の中、目のまわりには使用しないこと (6)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること (7)本製品をお使いになると弱い脱脂綿・綿棒等を使用し、患部に軽く塗布すること (8)マーキュロクロム液を向い患部に使用しないこと

第3類医薬品 殺菌消毒薬

日本薬局方
希ヨードチンキ
Dilute Iodine Tincture

50mL

成分・分量
本品100mL中
日局 ヨウ素 3 g
日局 ヨウ化カリウム 2 g
日局 エターナル 73.4mL
日局 保湿水 适量

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 小児の届かない所に保管すること
- (2) 直射日光及び火気を避け涼しい所に密栓して保管すること
- (3) 誘用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れないでください。
- (4) 使用期限を過ぎたものは使用しないこと
- (5) 開栓注意：容器の栓を開けるときは、液がこぼれることがありますので、注意すること
- (6) 使用してから薬がこぼれ衣服等が濡れたら、すぐに水洗し落ちにくいう場合は、チオ硫酸ナトリウム(ハイポ)の液で洗うこと。
液がこぼれて服などに付くと落ちにくくなるので、フタを開けるときは注意すること

第3類医薬品 殺菌消毒薬

日本薬局方

希ヨードチンキ

Dilute Iodine Tincture

50mL

火気厳禁

大洋製薬お客様相談窓口

0120-184328

受付時間 午前10時~午後5時(土・日曜、祝祭日は除く)

副作用被害救済制度

0120-149-931



紙 外箱 キャップ
ガラス:瓶

製造販売元
大洋製薬株式会社
東京都文京区本郷3-14-16



4 975175 011037

製造販売元
大洋製薬株式会社
東京都文京区本郷3-14-16

D12-TS

使用期限

貯蔵場所