

殺菌消毒パウダー

第3類医薬品


新ホルム散



差し込み口

開封年月日

年 月 日



■上手な使い方■

①



ご使用前に、傷口の汚れを水道水等できれいに洗って清浄にしてください。

②



傷口の上で、容器の中心を押して粉末を散布してください。

③



散布された傷口は救急絆創膏等で軽くおさえてください。

ご注意 (化膿の原因となりますので以下を守ってご使用ください。)\*ご使用前に、傷口の土や泥等の汚れをきれいに洗い落とすとして清浄にしてください。\*同じ傷口に繰り返しご使用になる場合は、患部に付着して固まった薬剤を水道水等で洗い落としてからご使用ください。

第3類医薬品 20g

新ホルム散

SHIN HORUMU POWDER

外傷散布剤 DUSTING POWDER

製造販売元 大洋製薬株式会社 東京都文京区本郷 3-14-16 大洋製薬お客様相談窓口 ☎0120-184328 (受付時間 午前10時~午後5時(土・日曜・祝祭日は除く))

2012年1月(記載要領変更に伴う改訂)

【効能・効果】

きりきず、すりきず、ただれ、靴ずれ

【用法・用量】

患部を清浄にし、1日2~3回適量を散布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を厳守すること
(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
(3)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科専門医の診療を受けること
(4)外用にのみ使用し、内服しないこと

【成分・分量】本品100g中 日局 アクリノール水合物...0.2g 日局 酸化亜鉛...13.0g 添加物：日局 沈降炭酸カルシウム、日局 タルク

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)小児の手の届かないところに保管すること
(2)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること
(3)誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと
(4)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと



本剤の使用前に、この外箱の説明事項を必ずお読みください。また、必要なとき読めるよう大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意

※ 相談すること

- 1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1)医師の治療を受けている人
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(3)患部が広範囲の人
(4)深い傷やひどいやけどの人
2.使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

Table with 2 columns: 関係部位 (Skin), 症状 (Itching, Rash, Redness, Swelling)

3.5~6日間使用しても症状がよくなる見えない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

G12-TS



御届印 各巻取簿

