

2012年1月(記載要領変更に伴う改訂)

本剤の使用前に、この説明事項を必ずお読みください。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 患部が広範囲の人
 - (4) 深い傷やひどいやけどの人
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- 3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果 切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒、痔疾の場合の肛門の殺菌・消毒

用法・用量 1日数回患部に噴霧又はガーゼ・脱脂綿に浸して塗布する。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 1) 定められた用法・用量を厳守すること
- 2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
- 3) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること
- 4) 外用にのみ使用し、内服しないこと

80mL

アラントイン配合 きず薬 スキネードα

スプレータイプ

Skin Aid



第3類医薬品

販売名:スキネードアルファスプレー

- ◎スキネードアルファスプレー容器の使い方◎
キャップをはずし、患部に向けてノズルを押すと薬液が霧状に出ます。患部の周囲も洗い流す様に数回噴霧してください。
* ノズルの先端を針等でつつくのは、大変危険ですのでおやめください。

成分・分量 本品100mL中

クロルフェニラミンマレイン酸塩	200mg
アラントイン	200mg
ベンザルコニウム塩化物	100mg

保管及び取扱い上の注意

- 1) 小児の手の届かない所に保管すること
- 2) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること
- 3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと
- 4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと

製造番号

使用期限

製造販売元
大洋製薬株式会社
東京都文京区本郷3-14-16

大洋製薬お客様相談窓口
☎ 0120-184328
受付時間 午前10時~午後6時(土日曜、祝祭日除く)

副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931



4 975175 011631



キャップ
ポンプ
ボトル
外装フィルム

I12-FL