

フェルゼアDX20ローション

第2類医薬品

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください。

- (1) 目のまわり、粘膜等
- (2) 引っかき傷等のきずぐち、亀裂(ひび割れ)部位
- (3) かさぶたの様に皮膚がはがれているところ
- (4) 炎症部位(ただれ・赤く腫れているところ)



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 薬や化粧品等による刺激症状又はアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、刺激感(痛み、熱感、ぴりぴり感)、はれ、かさぶたの様に皮膚がはがれる状態

3. 2週間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【成分・分量】(1g中)

尿素(皮膚軟化&水分保持成分).....200mg
ジフェニドラン(かゆみ止め成分).....10mg
リドカイン(かゆみ止め成分).....20mg
グリチルリチン酸二カリウム.....5mg
トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE).....5mg
添加物として、ジメチルポリシロキサン、1,3-ブチレングリコール、グリセリン、硬化油、ミリスチン酸イソプロピル、乳酸、水酸化Na、エド酸Na、パラベン、 α -メントール、ヒアルロン酸Na、カルボキシビニルポリマー、グリセリン脂肪酸エステル、ステアリン酸マクロゴール、その他1成分を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 本剤のついた手で、目など粘膜に触れないでください。
- (2) 高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (3) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早くご使用ください。

発売元

資生堂薬品株式会社

お客さま窓口

03-3573-6673

受付時間 9:30~17:00

(土、日、祝日を除く)

製造販売元

株式会社 資生堂

東京都中央区銀座7-5-5

MADE IN JAPAN

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931


この説明書は、本剤のご使用前に必ずお読みください。また、必要な時に読めるようにこの外箱を大切に保管してください。

【適応症】

かゆみを伴う乾燥性皮膚(成人・老人の乾皮症)



お風呂上がりや就寝後に体が温まってかゆい時



皮膚表面が白く粉をふいてかゆい時

【用法・用量】

1日数回、適量を患部に塗擦してください。

- ① 使いはじめは、図のように、キャップを手でおさえ、ノズルを持ち上げるように左方向に回しながら、上げてください。

※逆方向に回すと、ノズルが上がらなくなることがあります。ご注意ください。



- ② ノズルが上がったら、図のように、中味が出るまで数回押してください。



〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 小児(15歳未満)には使用させないでください。
- (3) 目に入らないようにご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。
- (5) 化粧品ではないので、適応症で定められた患部のみに使用し、基礎化粧品等の目的で顔面には使用しないでください。