

2013年2月改訂（記載要領変更に伴う改訂）

この添付文書は、本剤のご使用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

フェルゼア

手指のあれ・角化症治療薬

第3類医薬品

尿素20%配合

フェルゼアHA20クリーム

フェルゼアHA20クリームの特長

- フェルゼアHA20クリームは皮膚の水分保持能を高め、硬くなった皮膚をやわらかくしますので、手指のあれ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、さめ肌に効果的です。
- のびが良く、皮膚によくなじみます。

⚠使用上の注意

❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

次の部位には使用しないでください。

- (1) 目のまわり、粘膜等
- (2) 引っかき傷等のきずぐち、亀裂（ひび割れ）部位
- (3) かさぶたの様に皮膚がはがれているところ
- (4) 炎症部位（ただれ・赤く腫れているところ）



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 薬や化粧品等による刺激症状又はアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、刺激感（痛み、熱感、ぴりぴり感）、かさぶたの様に皮膚がはがれる状態

3. 2週間使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【適応症】

手指のあれ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、老人の乾皮症、さめ肌

【用法・用量】

1日数回、適量を患部にすりこんでください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 小児(15歳未満)には使用させないでください。
- (3) 目に入らないようにご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。
- (5) 化粧品ではありませんので、適応症で定められた患部のみに使用し、基礎化粧品等の目的で顔面には使用しないでください。

【成分・分量】(1g中)

成 分	分 量	作 用
尿 素	200mg	水分を引き寄せて皮膚をやわらかくします
グリチルリチン酸二カリウム	5mg	炎症をやわらげます
トコフェロール酢酸エステル (ビタミンE)	5mg	皮膚の血行を促進し、乾燥症状を改善します

添加物として、流動パラフィン、セタノール、ステアリン酸、ワセリン、ミリスチン酸イソプロピル、ベヘン酸、シリコン油、ステアリン酸グリセリン、ステアリン酸ポリオキシル、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、グリセリン、1,3-ブチレングリコール、ヒアルロン酸Na、クエン酸Na、水酸化Na、エデト酸Na、パラベン、その他1成分を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 本剤のついた手で、目など粘膜に触れないでください。
- (2) 高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (3) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早くご使用ください。

SHISEIDO

お問い合わせ先	
資生堂薬品株式会社	お客さま窓口 電話 03-3573-6673 受付時間 9:30～17:00 (土、日、祝日を除く)

発売元 資生堂薬品株式会社
東京都中央区銀座7-5-5

製造販売元 株式会社 資生堂
東京都中央区銀座7-5-5