

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。



木曽御嶽山 六こん風邪薬 第②類医薬品

ゴオウ・キキョウ・ジリュウ配合

六こん風邪薬は、生薬を配合した総合かぜ薬です。熱、のどの痛みをはじめ、かぜの諸症状を緩和します。



#### 使用上の注意



してはいけないこと（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる）

- 次の人は服用しないこと
  - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと  
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと  
（眠気等があらわれることがある。）
- 服用前後は飲酒しないこと
- 長期連用しないこと



#### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 授乳中の人。
  - 水痘（水ぼうそう）若しくはインフルエンザに かかっている又はその疑いのある乳・幼・小児（15歳未満）。
  - 高齢者。
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - 次の症状のある人。  
高熱、排尿困難
  - 次の診断を受けた人。  
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位  | 症 状         |
|-------|-------------|
| 皮 膚   | 発疹・発赤、かゆみ   |
| 消 化 器 | 吐き気・嘔吐、食欲不振 |
| 精神神経系 | めまい         |
| 呼 吸 器 | 息切れ、息苦しさ    |
| 泌 尿 器 | 排尿困難        |
| そ の 他 | 過度の体温低下     |

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

| 症状の名称                                                        | 症 状                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ショック<br>（アナフィラキシー）                                           | 服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。                                |
| 皮膚粘膜眼症候群<br>（スティーブンス・ジョンソン症候群）<br>中毒性表皮壊死融解症、<br>急性汎発性発疹性膿疱症 | 高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。 |
| 肝機能障害                                                        | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。                                          |
| 腎障害                                                          | 発熱、発疹、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる。                                                  |
| 間質性肺炎                                                        | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。                         |
| ぜんそく                                                         | 息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る。息苦しい等があらわれる。                                                          |
| 再生不良性貧血                                                      | 青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。                          |
| 無顆粒球症                                                        | 突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。                                                                    |

（裏面もお読み下さい）

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
口のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 効能・効果

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

## 用法・用量

1日3回、食後なるべく30分以内に服用する。

| 年齢          | 1回量     | 1日服用回数 |
|-------------|---------|--------|
| 15歳以上       | 2 カプセル  | 3 回    |
| 7 歳以上 15歳未満 | 1 カプセル  |        |
| 7 歳未満       | 服用しないこと |        |

## 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法及び用量を厳守すること。  
(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。  
(3) カプセルの取り出し方  
右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部分を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用すること。  
(誤ってそのまま飲み込んだりすると、食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながる。)



## 成分・分量

6カプセル（成人1日量）中

| 成 分                    | 分 量   | は た ら き                   |
|------------------------|-------|---------------------------|
| ゴオウ                    | 3 mg  | 鎮静作用がある                   |
| キキョウ末                  | 270mg | たんを切れやすくする                |
| ジリュウエキス                | 108mg | 熱を下げる                     |
| （原生薬ジリュウ402.84mgに相当する） |       |                           |
| アセトアミノフェン              | 535mg | 熱を下げ、のどの痛み、頭痛、関節の痛みをやわらげる |
| エテンザミド                 | 400mg |                           |
| クロルフェニラミンマレイン酸塩        | 7.5mg | くしゃみ、鼻水、鼻づまりをやわらげる        |
| デキストロメトルフアン臭化水素酸塩水和物   | 45mg  | せき中枢に直接作用し、無駄なカラセキをおさえる   |
| dl-メチルエフェドリン塩酸塩        | 40mg  | 気管支をひろげ、せきをしずめる           |
| 無水カフェイン                | 125mg | 頭痛をやわらげる                  |
| チアミン硝化物                | 15mg  | 消耗しがちなビタミンを補う             |
| リボフラビン                 | 6 mg  |                           |

添加物としてバレイショデンプン、ゼラチン、酸化チタン、赤色3号、黄色5号、ラウリル硫酸ナトリウムを含有します。

## 〈成分・分量に関連する注意〉

本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、これは本剤に含まれるリボフラビン（ビタミンB<sub>2</sub>）によるものです。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。  
(2) 小児の手の届かない所に保管すること。  
(3) 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる。）。  
(4) 使用期限が過ぎた製品は、服用しないこと。

## お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局、販売店または下記までお願いします。  
長野県製薬株式会社 お客様相談室  
電話：フリーダイヤル 0120-100-975  
受付時間：9:00～12:00 13:00～17:00（土曜、日曜、祝日を除く）

製 造 販 売 元



長野県製薬株式会社

〒397-0201 長野県木曽郡王滝村此の島100-1