

※※2006年7月改訂(第3版)

※2006年4月改訂

必ずこの添付説明書をお読みになってからご使用ください。また、必要に応じて読めるように大切に保管してください。

区分	一般用医薬品
日本標準商品分類番号	872615
承認番号	21500APZ00937000
薬価収載	未収載
貯法	室温保存
	火気を避けて保存
使用期限	個包装に記載

外皮用殺菌消毒剤 ステリコット®α エタノール含浸綿

【使用上の注意】

してはいけないこと

1. 次の部位には使用しないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

損傷皮膚及び粘膜[損傷皮膚及び粘膜への使用により、刺激作用を有するため]

2. その他

再使用しないでください。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること

1) 医師の治療を受けている人。

2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。

3) 薬や化粧品でアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること

使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ等

3. その他の注意

本剤の使用により、アレルギーテストの判定を誤らせることがある。

【成分及び分量】※

薬液100mL中

有効成分 日局エタノール…………… 84.2mL

溶剤 日局イソプロパノール…… 3.7mL

溶剤 日局精製水…………… 適量

担体 医療脱脂綿

【 効能又は効果 】※

手指・皮膚の殺菌、消毒。医療機器の消毒。

【 用法及び用量 】

そのまま塗擦、清浄用として用いる。

<用法及び用量に関連する注意>

- 1) 外用にのみ使用すること。
- 2) 口唇などの粘膜の部分、目の周りには使用しないこと。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。症状が重い場合は、眼科医の診断を受けること。
- 3) 同一部位に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。
- 4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- 5) 広範囲又は長時間使用する場合には、気化したアルコールの吸引に注意すること。
- 6) 本剤は引火性があるため、火気（電気メス使用等を含む）には十分注意すること。
- 7) アルコール分がタンパク質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、医療機器等を清浄する際は血清、膿汁等を十分に洗い落としてから使用すること。

【 保管及び取扱い上の注意 】※※

- 1) 小児の手の届かない所に保管してください。
- 2) 直射日光をさけ、なるべく涼しい所に保管してください。
- 3) 火気に近づけないでください。
- 4) 脱脂綿に小さな黒色又は黄色の斑点がある場合がありますが、これは綿花の葉や種子の一部で、変色したもの等ではありません。
- 5) 脱脂綿の端部分が、白く乾燥しているように見える場合がありますが、薬液は浸潤しております。

【 製造販売業者の氏名又は名称及び住所 】※

川本産業株式会社

大阪市中央区糸屋町2丁目4番1号

お客様相談窓口 TEL 06-6943-8956

(10:00～17:00 月～金 ただし祝祭日を除く)
