



殺菌消毒薬 外用/80mL

第2類医薬品

【効能】 きり傷、すり傷、さし傷、かき傷
靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒
痔疾の場合の肛門の殺菌・消毒

用法・用量： 1日数回、適量を患部に塗布するか、又は
本液を浸したガーゼをあてて包帯又は絆創膏にて覆う。

成分： 本品 80mL中 ベンザルコニウム塩化物 80mg
塩酸リドカイン 800mg ナファゾリン塩酸塩 80mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩 160mg **添加物：** 香料

【使用上の注意】

相談すること 1.次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること (1) 医師の治療を受けている人 (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人 (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (4) 患部が広範囲の人 (5) 深い傷やひどいやけどの人 2.次の場合は、直ちに使用を中止し、この容器を持って医師又は薬剤師に相談すること (1) 使用後、次の症状が皮ふにあらわれた場合、発疹・発赤、かゆみ、はれ (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

【用法に関する注意】 (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること (2) 目に入らないよう注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること (3) 外用にのみ使用すること

【保管及び取扱い上の注意】 (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること (2) 小児の手の届かない所に保管すること (3) 他の容器に入れ替えないこと (誤用の原因になったり品質が変わる) (4) 使用期限をすぎた製品は使用しないこと (使用期限は底面に記載)

製造販売元



タマガワ

玉川衛材株式会社

東京都千代田区岩本町2-2-16

TEL.03-3861-2031

玉川衛材(株)お客様相談窓口

TEL.03-3861-2037

受付時間 平日9:00~17:00(土・日・祝を除く)

副作用被害救済制度

TEL.0120-149-931