

第3類  
医薬品

## ポビドンうがい薬

## 効能又は効果

口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

## 用法及び用量

1回、本剤2～4mLを、約60mLの水でうすめて、1日数回うがいでください。計量コップをかたむけ、目盛りにあわせて薬液を入れ、コップを水平にもし、上部の水平の線まで水を入れると、約60mLになります。

## 《用法及び用量に関連する注意》

(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(2) うがい用のみ使用してください。(3) 本品は使用するときのみ希釈し、うすめた液は早めに使用してください。

## 成分及び分量 1mL中

ポビドンヨード 70mg(有効ヨウ素7mg)

添加物: サッカリンナトリウム水和物、L-メントール、ユーカリ油、無水エタノール、濃グリセリン、マクロゴール400、ヨウ化カリウム、香料

## 《成分及び分量に関連する注意》

本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(銀歯等)が変色することがあります。

## 保存及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(倒用の原因になり品質が変わります。)(4) 薬液が衣類や洗面台等に付着したときは、すぐに水で洗い流してください。(5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

(使用期限は箱側面・ボトル底面に記載)


 ボトル: PE  
キャップ: PP


紙 箱

ご使用に際して、この説明文を必ずお読みください。

## A 使用上の注意事項

## ※してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は使用しないこと  
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがあるひと

## B 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

(2) 次の症状のある人、口内のひびきなど

(3) 次の診断を受けた人、甲状腺機能障害

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症状             |
|------|----------------|
| 皮膚   | 発疹・発赤、かゆみ      |
| 口    | あれ、しみる、灼熱感、刺激感 |
| 消化器  | 吐き気            |
| その他  | 不快感            |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称              | 症状                                                          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| ショック<br>(アナフィラキシー) | 使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。 |

3. 5～6日使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください



4 901957 050284

## ポビドン

第3類医薬品

のどの殺菌・消毒、口臭除去に

使いやすい  
計量コップ付き

うがい薬

開封年月日

開封時に記入してください。

## ポビドン

第3類医薬品

のどの殺菌・消毒、口臭除去に

使いやすい計量コップ付き

うがい薬



120mL

## 〈うがいのしかた〉



1. 計量コップをかたむけて、本品を2と4の線の間まで入れます。

2. コップを水平に戻し、60の線まで水を入れます。

## 1度目のうがい(口臭除去)

うがい液を口に含み、口全体にいきわたるようにクチュクチュとうがいをします。



## 2度目のうがい(殺菌・消毒)

のどの奥まで、うがい液が届くように上を向いてガラガラとうがいをします。



使用

期限

製造

番号

玉川南村株式会社 お客様相談窓口  
TEL: 03-3861-2037  
受付時間 9:00～17:00(土・日・祝を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120(149)931

製造販売元

タマカワ

玉川南村株式会社

〒101-0032

東京都千代田区岩本町2-2-16

CD-O-K

副作用被害救済制度 0120(149)931