

肩こり・腰痛・筋肉痛・関節痛に

タズソール[®] エイト 《外用鎮痛消炎薬》

特 徴

タズソール[®]は、温感による皮ふ刺激作用で血行を促進し、新陳代謝を活発にすることで、肩のこりや筋肉の痛みをやわらげる外用鎮痛消炎軟膏です。

- ◆速効性かつ持続性の温感効果が得られます。
- ◆ノニル酸ワニリルアミドを中心にテレピン油、ユーカリ油が皮ふ患部の血液循環を良くし、筋肉のこり、痛み、疲れに効果をあらわします。
- ◆頑固な肩こり、腰痛、筋肉痛などの痛みをやわらげます。
- ◆激しいスポーツや重労働を行った後の筋肉疲労の回復を促します。
- ◆軟膏であるため、使用量の調節が容易です。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

次の部位には絶対に使用しないでください。

- (1)目の周囲、粘膜(鼻、口腔、肛門等)等
- (2)湿疹、かぶれ、傷口及び化膿している患部



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (3)薬によりアレルギー症状(発疹、かぶれ等)を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1)使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

- (2)5～6日間使用しても症状がよくなる場合

効能・効果

○肩こり、リウマチ、神経痛、うちみ、ねんざ、筋肉痛、腰痛、関節痛、しもやけ、筋肉疲労


用法・用量

患部皮膚面をきれいにふいた後、本品1～2gを随時塗擦する。

(ただし、創傷面・粘膜および眼などには絶対に塗布しないでください。)

〈用法・用量に関連する注意〉

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 表面に軽くのぼすように最初は、ためし塗りとして、チューブから1mm程度出した量を皮膚の表面に軽くのぼすようにやさしく塗ってください(すりこまないでください)。ためし塗りの量を参考にして、塗布範囲にあわせて、少量からご使用ください。
- 患部全体にすりこまずに、軽くのぼして塗ってください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 外用にのみ使用し、内服しないでください。
- 塗った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- 入浴前の使用は避けてください。
- 使用後は石鹸で手をよく洗ってください。



激しい痛みや熱感を感じた場合には…

- ① 石鹸をよく泡立て、やさしくなできるように患部を洗ってください。(図1)
- ② ①を5回程度繰り返してください。
※この際、ゴシゴシと強くこすらないでください。薬効成分が再浸透され逆効果です。
- ③ 冷水や軽くしぼったぬれタオルなどで、患部を冷やしてください。(図2)
- ④ 痛みや熱感がひかないようでしたら、現品をご持参の上、医師に相談してください。

成分・分量

1g中

成 分	含 量	働 き
ノニル酸ワニリルアミド	2.3mg	温感による刺激作用により、血管を拡張させ、血行を改善し、筋肉中の疲労物質や痛みの物質を取り除きます。
dl-カンフル	100mg	知覚神経の末梢に作用して、痛みを抑えます。
テレピン油	90mg	皮膚刺激作用により痛みを抑えます。
ユーカリ油	10mg	皮膚刺激作用により、血行を改善し、皮膚を温めます。

※添加物として、白色ワセリン、パラフィン、ソルビタン脂肪酸エステル、香料を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

包 装

タズソールB 20g(チューブ入り)、500g(瓶入り)

■ご相談・お問い合わせ先■

株式会社 雪の元本店 お客様相談室 電話 0744-22-2440
受付時間 9:00～12:00 13:00～17:00(土、日、祝日を除く)



製造販売元
株式会社 雪の元 本店
〒634-0815 奈良県橿原市大谷町182番地
®登録商標