

この説明書は、使用前に必ずお読み下さい。
また、必要時に読めるよう保管しておいて下さい。

急性・アレルギー性鼻炎薬

ミナトシキ液 20mL

MINATOSIKI LIQUID

アレルギー性鼻炎は、鼻水、鼻づまり、くしゃみを主症状とする疾病で、スギの花粉、ハウスダストなどが原因物質といわれています。ミナトシキ液は、鼻粘膜の血管を収縮して充血をとりのぞき、アレルギー症状をおさえる成分を配合しています。また粘性基剤を用いていますので、点鼻後の鼻腔からの液ダレが少なく、使用感のすぐれた点鼻薬です。

使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないで下さい。
7歳未満の乳幼児
2. 点鼻薬にのみ使用し、目や耳に使用しないで下さい。
3. 長期連用しないで下さい。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - (4) 今までに点鼻薬によるアレルギー症状（例えば、発疹・発赤、腫脹、刺激感等）を起こしたことがある人
 - (5) 次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
鼻	はれ、刺激感

- (2) 3日間くらい使用しても症状がよくなる場合

【効能・効果】

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：
鼻づまり、鼻水（鼻汁過多）、くしゃみ、頭重

【用法・用量】

下記の量を、鼻腔内に噴霧するか、又はスポイトで滴下して下さい。
（噴霧の場合は別売りのミナトシキフム器をご利用下さい）

年 齢	1 回 量		1 日使用回数
	噴 霧	スPOINT	
成人（15歳以上）	1～2 度	1～2 滴	4～5 回
7 歳以上15歳未満			
7 歳未満の乳幼児			

※なお、使用間隔は3時間以上あけて下さい。

【用法・用量に関連する注意】

1. 定められた用法・用量を厳守して下さい。過度に使用すると、かえって鼻づまりを起こすこともあるので、使い過ぎないように注意して下さい。
2. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
3. 点鼻用のみに使用して下さい。

【成分・分量】

1 mL 中

有効成分	塩酸ナファゾリン	0.5mg
	マレイン酸クロルフェニラミン	1mg
添 加 物	塩化ベンゼトニウム、グリセリン、銅クロロフィリンナトリウム、プロピレングリコール、ポリエチレングリコール、l-メントール	

【保管及び取扱い上の注意】

1. 小児の手のとどかない所に保管して下さい。
2. 直射日光をさけ、なるべく涼しい所に密栓して保管して下さい。
3. 誤用をさけ、品質を保持するために他の容器に入れ替えないで下さい。
4. 他の人と共用しないで下さい。
5. 使用に際しては説明書を良くお読み下さい。

【包装】

・ミナトシキ液：20mL

本製品に関するお問い合わせは、お買い求めの店又は下記にお願い申し上げます。

ミナト製薬株式会社 「お客様相談室」

フリーダイヤル：0120-47-3710

受付時間：9:00～17:00（土、日、祝日を除く）



発売

ミナト製薬株式会社

東京都中央区銀座1丁目14番11号

製造販売

原沢製薬工業株式会社

東京都港区高輪3丁目19番17号