

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

## 第2類医薬品

### 小児用かぜ内服薬 新小児ジキニン®シロップ。

新小児ジキニンシロップは、お子さまのかぜによる諸症状を緩和する内服液剤です。

#### 【使用上の注意】



\*本剤は小児用ですが、かぜ薬として定められた一般的な注意事項を記載しています。

#### してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる。)

1. 次の人は服用しないでください。

- (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乘物酔い薬、アレルギー用薬等)

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。

(眠気等があらわれることがある。)

4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。

5. 服用前後は飲酒しないでください。

6. 長期連用しないでください。



#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。

(2)妊娠又は妊娠していると思われる人。

(3)高齢者。

(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(5)次の症状のある人。高熱、むくみ、排尿困難

(6)次の診断を受けた人。甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステイーブンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死溶解症、急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなつた皮膚上に小さなツブツブ(小膿泡)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。

間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白く見える、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらつとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。便秘、口のかわき、眠気
4. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

### 【効能・効果】

かぜの諸症状(せき、発熱、頭痛、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、のどの痛み、たん、悪寒、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和。

### 【用法・用量】

次の1回量を(添付の計量カップではかり)食後なるべく30分以内に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
3才以上 7才未満	4 mL	3回
1才以上 3才未満	3 mL	
1才未満	服用しないこと	

必要な場合には就寝前の服用も加えて1日6回まで服用できますが、このような場合には約4時間の間隔をおいてください。

### 【用法・用量に関する注意】

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

### 【成 分】 (24mL中)

ジヒドロコデインリン酸塩	8 mg	クロルフェニラミンマレイン酸塩	2.5 mg
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	10 mg	無水カフェイン	50 mg
アセトアミノフェン	300 mg	カンゾウ(甘草)エキス	332 mg (原生葉換算量1,660 mg)
添加物としてアルコール、クエン酸Na、パラベン、プロピレングリコール、白糖を含有します。			

### 【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光のあたらない涼しい所に密栓して保管してください。

(2)小児の手のとどかない所に保管してください。

(3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

(4)使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

(5)開栓後は、長期保存しないでください。

#### =安全キャップについて=

本品には、薬量を計る計量カップ(透明)と、お子さまの誤飲を防ぐための安全キャップ(茶色)とが、透明なフィルムに包まれて添付されています。ご使用に際しては、この安全キャップをご利用ください。(この安全キャップを取付けますと、お子さまにはキャップが簡単にあけられないようになります。)

ご使用の際には、透明のフィルムをはがし、安全キャップをとり出したのち、下記手順にしたがって取付けてください。

#### 【取付け方】

安全キャップ(茶色)を容器の白いキャップの上にかぶせ、右図のようにパチンと音がするまで手のひらで上から強く押し、取付けます。この状態では、安全キャップはから回りします。

◎いったん安全キャップを取付けたら、取りはずさないでください。



#### 【あけ方】

右図のように①上から強く押しながら②の矢印の方向に回し、あけてください。

#### 【しめ方】

まず普通のキャップをしめる要領で回し、から回りし始めたら、必ず右図のように①上から強く押しながら③の矢印の方向に回し、しっかりしめてください。



### 問い合わせ先

1) お買い求めのお店

2) 全薬工業お客様相談室

住 所: 〒112-8650 東京都文京区大塚5-6-15

電 話: 03 (3946) 3610

受付時間: 9:00~17:00 (土・日・祝祭日を除く)



製造販売元 全薬工業株式会社

東京都文京区大塚5-6-15

<http://www.zenyaku.co.jp>