

使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

外用湿疹・皮ふ炎用薬

橙色 **ペークミン**®

第3類医薬品

橙色ペークミンは、しっしん、皮ふ炎による腫れ・発赤、かゆみ、かぶれ、ただれなどを改善する外皮用軟膏です。

1. 低刺激性の油脂性基剤を使用しているため、ジुकジुक(湿潤)型にもカサカサ(乾燥)型にもお薦めします。
2. 炎症を抑えるグリチルレチン酸、患部を保護し、回復を促すアルクロキサとカラミン、患部を殺菌するアクリノール水和物を配合しています。
3. ステロイド剤は配合していません。

【使用上の注意】



相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)医師の治療を受けている人。
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3)湿潤やただれのひどい人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

湿疹、皮ふ炎、かぶれ、ただれ、あせも、かゆみ、しもやけ、虫さされ。

【用法・用量】

1日1～4回直接患部へ塗布するか、ガーゼ又はリント布等に適当にのばして貼付してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3)外用にのみ使用してください。

【成分】

成分	分量(1g中)	はたらき
アルクロキサ	5 mg	創傷治癒促進作用を有します。 また、収れん作用により患部を保護します。
グリチルレチン酸	10 mg	非ステロイド性抗炎症成分。 湿疹・皮ふ炎などの炎症を抑え、かゆみやかぶれを改善します。
カラミン	100 mg	患部保護作用、抗炎症作用を有します。 また、湿潤型の患部では分泌物を防ぎ、乾燥を促します。
アクリノール水和物	0.5 mg	刺激の少ない殺菌消毒剤です。

添加物として流動パラフィン、ステアリン酸グリセリル、ワセリンを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)高温になると溶けることがありますので、直射日光のあたらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)寒さで軟膏が出にくいときは、チューブを手の中でしばらくあたためてからお使いください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は、使用しないでください。

問い合わせ先

- 1) 購入した薬局・薬店
- 2) 全薬工業お客様相談室
住 所：〒112-8650 東京都文京区大塚5-6-15
電 話：03 (3946) 3610
受付時間：9:00～17:00 (土・日・祝祭日を除く)



製造販売元 **全薬工業株式会社**
東京都文京区大塚5-6-15
<http://www.zenyaku.co.jp>