

この説明文書は服用前に必ずお読みください。
また必要なとき読めるように保存しておいてください。

胃痛・腹痛・胃酸過多

胃腸鎮痛鎮痙薬

い ちょう はん こん たん

胃腸反魂丹

第2類医薬品

シオノギ製薬

⚠ 使用上の注意……

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故がおこりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他の胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する他の胃腸薬、乗物酔い薬
2. 服用後、乗物または機械類の運転操作をしないでください
(目のかすみ、異常なまぶしさなどの症状があらわれることがあります)
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
(母乳に移行して乳児の脈が、速くなることがあります)

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください
 - (1)医師の治療を受けている人
 - (2)妊婦または妊娠していると思われる人
 - (3)高齢者
 - (4)薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人
 - (5)次の症状のある人
排尿困難
 - (6)次の診断を受けた人
心臓病、緑内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
泌尿器	排尿困難
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください
□のかわき、便秘、目のかすみ
4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

その他の注意

母乳が出にくくなることがあります

……効能・効果……

胃痛、腹痛、さしこみ（せんつう 疝痛、しゃく 癪）、胃酸過多、胸やけ

……用法・用量……

次の量を水またはぬるま湯でおのみください。
また、おのみになる間隔は4時間以上おいてください。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
成人（15才以上）	30丸	2回を限度とする
11才以上15才未満	20丸	
8才以上11才未満	15丸	
5才以上 8才未満	10丸	
3才以上 5才未満	7丸	
3才未満	服用させないこと	

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 3才以上の幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意してください。

……成分・分量……

胃腸反魂丹は、茶褐色の丸剤で、60丸（成人1日量）中に次の成分を含有しています。

（1包：30丸入）

成 分	含 量（60丸中）
エンメイソウ	900mg
オウバク	1200mg
オウレン	500mg
ゲンチアナ	200mg
モッコウ	100mg
ロートエキス	40mg

添加物として 沈降炭酸カルシウム、寒梅粉、サリチル酸、カルメロースナトリウム、タルク、アラビアゴム末、薬用炭、三二酸化鉄を含有しています。

……保管および取扱い上の注意……

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない、涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり、品質が変化します）
- (4)1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (5)使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。

……お問い合わせ先……

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記までお願いいたします。

塩野義製薬株式会社「医薬情報センター」

電話：大阪 06-6209-6948、東京 03-3406-8450

受付時間：9時～17時（土、日、祝日を除く）

「副作用被害救済制度」について

（独）医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話：0120-149-931（フリーダイヤル）

販売元

塩野義製薬株式会社

大阪市中央区道修町3丁目1番8号

製造販売元

株式会社 廣 貴 堂

富山市梅沢町2丁目9番1号