

乗りもの酔い薬

トラベルミン® チュロップ しモン味 第2類医薬品

トラベルミン チュロップレモン味は、乗りもの酔いによるめまい・吐き気などの症状を予防・緩和し、旅行やお出かけを快適で楽しいものにするためのお薬です。お子様が服用しやすいドロップタイプなので、出発前のあわただしいときや気分が悪くなったときでも、その場ですぐに服用できます。



使用上の注意



してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる】

- ① 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。
他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、胃腸鎮痛鎮痙薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、アレルギー用薬等)
- ② 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)



相談すること

- ① 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 高齢者
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(5) 次の症状のある人：排尿困難
(6) 次の診断を受けた人：緑内障、心臓病
- ② 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ	泌 尿 器	排尿困難
精神神経系	頭痛	そ の 他	顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

- ③ 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
口のかわき、便秘、眠気、目のかすみ

効能・効果、用法・用量、成分と働き、保管及び取扱い上の注意については裏面をご覧ください。

効能・効果

乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和

用法・用量

乗物酔いの予防には、乗車船30分前に、次の1回量をかむか、口中で溶かして服用してください。

年齢	1回量	服用回数
成人(15歳以上)	2錠  	4時間以上の間隔を置いて1日2回まで
11歳以上15歳未満		
5歳以上11歳未満	1錠 	
5歳未満	✕服用しないこと	

なお、追加服用する場合は、1回量を4時間以上の間隔を置いて服用してください。1日の服用回数は2回までとしてください。

【用法・用量に関連する注意】

小児(5歳以上15歳未満)に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。修学旅行などに持たせる場合には、事前に用法、用量など、服用方法をよく指導してください。

ご注意

- ・本剤はかむか、口中で溶かして服用する薬剤です。かみにくい場合は、歯を傷めることなどのないように、溶かして服用してください。また、誤って喉につまらせないように、十分に注意してください。
- ・服用する時は1錠ずつとし、1度に2錠を口の中に入れてください。

成分と働き

1回量(11歳以上)2錠中に次の成分を含みます。

成分	含量	働き
ドクロルフェニラミンマレイン酸塩	1.33mg	自律神経に働き、乗りもの酔い症状を予防・緩和します。
スコポリン臭化水素酸塩水和物	0.166mg	乗りものによって起こる感覚の混乱を軽減します。

【添加物】

クエン酸、l-メントール、香料、アセスルファムK、還元パラチノース、グリセリン脂肪酸エステル、ビタミンB₂

保管及び取扱い上の注意

- ① 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- ② 小児の手の届かない所に保管してください。
- ③ 他の容器に入れ替えないでください。また、本容器内に他の薬剤等を入れないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- ④ 1包を分けて服用したときの残りは、袋の口を折り返して保管し、なるべく早く服用してください。
- ⑤ 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

本品についてのお問い合わせ先

●お買い求めのお店

●エーザイ「お客様ホットライン」フリーダイヤル 0120-161-454

受付時間／平日9:00～18:00(土・日・祝日9:00～17:00) 携帯電話やPHSからもお問い合わせできます。



製品の内容はホームページでも紹介しています。

eisai.jp

製造販売元

高市製薬株式会社
奈良県高市郡明日香村野口10

発売元



エーザイ株式会社
東京都文京区小石川4-6-10