

乗りもの酔い薬

トラベルミン[®]内服液

第2類医薬品

トラベルミン内服液は、うめ風味で飲みやすい液剤です。

車や船の中でも、すぐに飲めて、乗りもの酔いによるめまい・吐き気などの症状を予防、緩和します。



使用上の注意



してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる】

①本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。

他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、胃腸鎮痛鎮痙薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、アレルギー用薬等)

②服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。

(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)

③授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。



相談すること

①次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1)医師の治療を受けている人

(2)妊婦又は妊娠していると思われる人

(3)高齢者

(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

(5)次の症状のある人：排尿困難

(6)次の診断を受けた人：緑内障、心臓病

②服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
泌 尿 器	排尿困難
そ の 他	顔のほてり、異常なまぶしさ

③服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

口のかわき、便秘、眠気、目のかすみ

効能・効果

乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和

用法・用量

乗物酔いの予防には、乗車船30分前に、次の量を服用してください。

年齢	1回量	服用回数
11歳以上	1瓶(20mL)	4時間以上の間隔を置いて1日3回まで
11歳未満	✕服用しないこと	

なお、追加服用する場合は、1回量を4時間以上の間隔を置いて服用してください。
1日の服用回数は3回までとしてください。

【用法・用量に関連する注意】

小児(11歳以上15歳未満)に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分と働き

1回量(11歳以上)1瓶(20mL)中に次の成分を含みます。

成分	含量	働き
ジフェンヒドラミン塩酸塩	30mg	自律神経に働き、乗りもの酔い症状を予防・緩和します。
スコポラミン臭化水素酸塩水和物	0.1mg	乗りものによって起こる感覚の混乱を軽減します。
無水カフェイン	30mg	乗りものによって起こる感覚の混乱を予防します。

【添加物】

安息香酸Na、エタノール、エチルバニリン、クエン酸、クエン酸Na、グリセリン、D-ソルビトール、バニリン、パラベン、ブドウ糖果糖液糖、プロピレングリコール、l-メントール、香料、還元麦芽糖水アメ、グリシン、ポビドン

保管及び取扱い上の注意

- ①直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- ②小児の手の届かない所に保管してください。
- ③他の容器に入れ替えないでください。また、本容器内に他の薬剤等を入れないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- ④使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

【本品についてのお問い合わせ先】

- お買い求めのお店
- エーザイ「お客様ホットライン」フリーダイヤル 0120-161-454
受付時間/平日9:00~18:00(土・日・祝日9:00~17:00) 携帯電話やPHSからお問い合わせできます。



製品の内容はホームページ
でも紹介しています。

eisai.jp

製造販売元

滋賀県製薬株式会社

滋賀県甲賀市甲賀町滝879

発売元



エーザイ株式会社

東京都文京区小石川4-6-10

3HX