

2012年9月改訂
(記載要領変更に伴う改訂)

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

ビタミンB₂主薬製剤

チョコラBB[®] こどもシロップ

第3類医薬品

ビタミンB₂は、「脂質代謝のビタミン」「皮膚・粘膜のビタミン」と呼ばれ、不足すると疲れやすくなったり、しっしん、皮膚炎、口内炎などの症状があらわれやすくなります。

チョコラBB[®]こどもシロップは、ビタミンB₂を主成分とし、ビタミンB₁、ビタミンB₆をはじめ、抗皮膚炎ビタミンとして知られているビオチンも配合した、お子様にさらっとのみやすいシロップ剤です。



使用上の注意



相談すること

- ① 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹
消 化 器	胃部不快感

- ② 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
下痢
- ③ 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

次の諸症状の緩和：

肌あれ、かぶれ、ただれ、にきび、湿疹、皮膚炎、口内炎、口角炎、口唇炎、舌炎、赤鼻、目の充血、目のかゆみ
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」

次の場合のビタミンB₂の補給：

肉体疲労時、病中病後の体力低下時

用法・用量、成分と働き、保管及び取扱い上の注意については裏面をご覧ください。

用法・用量

1日2回、添付の計量容器で下記の分量を量り、**食後**に服用してください。

年齢		1回量	服用回数
7歳以上15歳未満		 15mL	1日2回
1歳以上7歳未満		 7.5mL	
3ヵ月以上1歳未満		 5mL	
3ヵ月未満		✗ 服用しないこと	

【用法・用量に関連する注意】

小児(3ヵ月以上15歳未満)に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分と働き

1瓶30mL中に次の成分を含みます。

成分	含量	働き
リボフラビンリン酸エステルナトリウム (ビタミンB ₂ リン酸エステル)	19mg	・皮膚や粘膜の健康維持に働きます。 ・脂肪の代謝を助けエネルギーに変えます。
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	12mg	・皮膚や粘膜の健康維持に働きます。 ・タンパク質の代謝を助けエネルギーに変えます。
チアミン硝酸化物(ビタミンB ₁ 硝酸塩)	6mg	・糖質(炭水化物)の代謝を助けエネルギーに変えます。
ニコチン酸アミド	20mg	・皮膚や粘膜の健康維持に働きます。
ピオチン	250μg	・皮膚や粘膜の健康維持に働き、皮膚の炎症等を抑えます。

【添加物】

安息香酸Na、エタノール(0.1mL以下)、クエン酸、クエン酸Na、D-ソルビトール、パラベン、プロピレングリコール、香料、還元麦芽糖水アメ、グリシン、没食子酸プロピル、ポビドン、DL-リンゴ酸、pH調整剤

【成分に関連する注意】

本剤の服用により、尿が黄色くなることがありますが、これは本剤に含まれているビタミンB₂が吸収され、その一部が尿中に排泄されるため心配はありません。

保管及び取扱い上の注意

- ① 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- ② 小児の手の届かない所に保管してください。
- ③ 開封後は冷蔵庫などに保管し、お早めに服用してください。
- ④ 他の容器に入れ替えないでください。また、本容器内に他の薬剤等を入れないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- ⑤ 服用後は、計量容器を水洗いし、お薬と一緒に大切に保管してください。
- ⑥ 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

本品についてのお問い合わせ先

- お買い求めのお店
- エーザイ「お客様ホットライン」フリーダイヤル 0120-161-454
受付時間/平日9:00~18:00(土・日・祝日9:00~17:00) 携帯電話やPHSからもお問い合わせできます。



チョコラBB子どもシロップの製品内容は
ホームページでも紹介しています。

chocola.com

製造販売元 第一薬品工業株式会社
富山県富山市草島15-1

発売元  エーザイ株式会社
東京都文京区小石川4-6-10

SU-BIX