

# 鎮咳去痰薬 せき・たんに

## トニン®咳止錠

下線部:2009年12月改訂

第2類  
医薬品

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。

### 鎮咳去痰薬 せき・たんに トニン®咳止錠

- リン酸ジヒドロコデインなどのせき止め成分に、たんをきる生薬カンゾウエキとグアイフェネシンを配合しています。
- たんをきり、せきを鎮める白色の糖衣錠です。



#### 使用上の注意



#### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください  
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)、鎮静薬
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください  
(眠気があらわれることがあります。)
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください



#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3) 高齢者。  
(4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。  
(5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(6) 次の症状のある人。  
高熱、排尿困難  
(7) 次の診断を受けた人。  
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害



2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位  | 症 状        |
|-------|------------|
| 皮 膚   | 発疹・発赤、かゆみ  |
| 消 化 器 | 悪心・嘔吐、食欲不振 |
| 精神神経系 | めまい        |
| そ の 他 | 排尿困難       |

(2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください  
便秘、口のかわき

★裏面につづく

【効 能】  
せき、たん

【用法・用量】

下記の1回服用量を食後なるべく30分以内に服用します。

| 年 齢       | 1回服用量      | 1日服用回数 |
|-----------|------------|--------|
| 大人(15才以上) | 3錠         | 3回     |
| 11～14才    | 2錠         |        |
| 11才未満     | 服用しないでください |        |

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量と働き】9錠中

| 成 分                | 分 量    | 働 き                                      |
|--------------------|--------|------------------------------------------|
| リン酸ジヒドロコデイン        | 30mg   | せきの中枢に働いて、せきを鎮めます。                       |
| dl-塩酸メチルエフェドリン     | 37.5mg | 気管支をひろげて、せきを鎮めます。                        |
| マレイン酸<br>クロルフェニラミン | 12mg   | アレルギーが原因となって起こるせきを鎮めます。                  |
| グアイフェネシン           | 210mg  | 気道粘液の分泌を高め、のどにからんだたんをつずめて、出しやすくします。      |
| カンゾウエキ             | 135mg  | 気道粘液の分泌を高め、たんをつずめ、また、気管支の運動を促進してたんをきります。 |
| 無水カフェイン            | 150mg  | 中枢神経に作用して他の成分の働きを助けます。                   |

添加物として、乳糖、セルロース、リン酸水素Ca、CMC-Ca、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、ポリビニルアセタールジエチルアミノアセート、ポリビニルアルコール(部分ケン化物)、タルク、シメチルポリシロキサン、二酸化ケイ素、酸化チタン、白糖、カルナウバロウを含有します。

#### ◎保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。



#### ◎せき、たんが早く楽になるためのアドバイス

1. 睡眠をとり無理をしないことが治療の第一歩。外出するときは、あたたかくして体を冷やさないように注意しましょう。
2. 水分を多くとるようにしましょう。たんのきれがよくなり、せきが楽になります。
3. 部屋の空気をきれいにしましょう。また、部屋をあたたため、なるべく湯気をたてて空気の乾燥を防ぎましょう。
4. うがいを心がけましょう。のどの不快感がやわらぎ、せきやたんが楽になります。外出のときは、マスクも効果があります。



副作用被害救済制度のご案内はこちら  
(株)医薬品医療機器総合機構  
http://www.pmda.go.jp/kokuhaku/index.html  
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの  
お店又は下記にお問い合わせください。  
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口  
電話 03(5412)7333  
受付時間: 9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元  
佐藤製薬株式会社  
東京都港区元赤坂1丁目5番27号