

化膿性皮膚疾患用薬

ポリベース[®]

すり傷・きり傷などの化膿に



sato

セルメディケーションをサポートします
HEALTHCARE INNOVATION

第2類医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。

化膿性皮膚疾患用薬

ポリベース[®]

すり傷・きり傷などの化膿に

ポリベースは…

- すり傷、きり傷などの化膿やとびひに効果をあらわします。
- 抗菌剤スルファジアシンが化膿を抑えます。
- べとつかず、ぬり心地のよいクリームです。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談ください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4) 患部が広範囲の人。
 - (5) 潤滑やただれのひどい人。
 - (6) 深い傷やひどいやけどの人。
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください
 - (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
 - (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合



【効 能】

化膿性皮膚疾患、とびひ

【用法・用量】

患部に適量を塗布します。

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。

◎ポリベースは薬剤の浸透力の強い乳剤性基剤ですので、ただれていたり、じゅくじゅくのひどい患部に使用するとかえって悪化することがあります。この場合には患部をかわかして治りを早める水溶性基剤の軟膏（商品名：ポリ）をご使用ください。

★裏面につづく

【成分・分量と働き】

成 分	分 量	働 き
スルファジアシン	5%	化膿の原因となるブドウ球菌や大腸菌に対して抗菌作用をあらわすサルファ剤です。
塩酸ジフェンヒドラミン	1%	傷の治りかけなどに起こるムズムズしたかゆみを抑えます。
酸化亜鉛	5%	患部の治りを早めます。

添加物として、流動パラフィン、セタノール、ステアリン酸、プロピレングリコール、ポリオキシエチレンセチルエーテル、ポリオキシエチレングリセリルモノセテアレート、グリセリルモノセテアレート、ショ糖脂肪酸エステル、パラベン、クエン酸Na、香料、フェニルエチルアルコール、ベンジルアルコールを含有します。

◎保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。



◎傷のお手当

- すり傷やきり傷は、放っておくと細菌が侵入して化膿しやすくなります。お早めにお手当し、傷口を清潔に保つことが大切です。
- 傷口はきれいに洗いましょう。
 - 包帯や絆創膏は、いつも清潔なものを。
 - 出血が多い時は、傷口を心臓より高い位置にしておく、より早く止まります。

副作用報告制度のお願い
（独）医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

本製品についてのお問い合わせは、お問い合わせの
お店又は下記にお願い申し上げます。
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
電話 03(5412)7393
受付時間：9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

製造販売元（輸入）
佐藤製薬株式会社
東京都中央区新富1丁目1番1号
MANUFACTURED BY
SATO PHARMACEUTICAL CO., LTD. TOKYO
SATO PHARMACEUTICAL CO., LTD. JAPAN
MADE IN JAPAN

T-6