

おむつかぶれ・あせも・湿疹・皮膚炎用薬
ビタミンA・D₂ 配合

ポリベビー®



sato

セルフメディケーションをサポートします
HEALTHCARE INNOVATION

第3類医薬品

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。

おむつかぶれ・あせも・湿疹・皮膚炎用薬
ビタミンA・D₂ 配合

ポリベビー®

ポリベビーは…

- おむつかぶれやあせも、湿疹等に効果をあらわす、赤ちゃんに おすすめの軟膏です。
- かゆみを鎮める抗ヒスタミン剤のジフェンヒドラミンに、患部の 治りを助けるビタミンA、D₂、酸化亜鉛、そして細菌の感染を防ぐ 殺菌剤のトリクロロカルバニドを配合しています。
- 基剤に植物油を使用した、お肌にやさしい軟膏です。患部がカサカサ している時やジュクジュクしている時などにも使用できます。



使用上の注意



■ 相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談ください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4) 湿潤やただれのひどい人。
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください
 - (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合



〔効 能〕

おむつかぶれ、あせも、湿疹、皮膚炎、ただれ、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんま疹

〔用法・用量〕

1日1～2回適量を患部に塗布します。

★裏面につづく

〔用法・用量に関連する注意〕

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。

〔成分・分量と働き〕10g中

成 分	分 量	働 き
ビタミンA油	10mg (ビタミンAとして10,000IU)	皮膚を健康に保ち、かさつきなどを防ぎます。
エルゴカルシフェロール(ビタミンD ₂)	0.01mg	
トリクロロカルバニド	30mg	殺菌作用により、細菌による二次感染を防ぎます。
ジフェンヒドラミン	50mg	抗ヒスタミン作用により、かゆみを抑えます。
酸化亜鉛	1,000mg	分泌物を吸着して患部を乾かします。

※IUは国際単位

添加物として、BHA、サラシミツロウ、ナタネ油、香料(フェニルエチルアルコール、ベンジルアルコールを含む)を含有します。

◎保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) チューブ口の軟膏(油分)を清潔なガーゼやティッシュでよく拭いてから閉めてください。軟膏(油分)がついたままキャップをしめると強く閉まりすぎることがあります。
- (5) 使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。



上手な使い方

1. 患部を清潔にしてからポリベビーをお使いください。
2. 通常の場合には……
指先で強くこすらないようにうすく塗布してください。
1日1～2回塗布し、治りがけてきたら回数をはらしてください。
3. 患部がジュクジュクしていたり、ただれている場合やかさぶたがある場合には……
リント布やガーゼに厚目にのぼして貼ります。
かさぶたは無理にはがさないようにしてください。

副作用検査救済制度のお問い合わせ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kokochigo.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの
お店又は下記にお願いいたします。
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
電話 03(5412)7393
受付時間 9:00～17:00(土日・祝日を除く)

製造販売元
佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号