

☆本品に添付文書はついていません。ケースの表示が代用しています。

インドメタシン 0.5%配合パップ剤

インサイド®ハイパップP

インドメタシンが痛みのもと(プロスタグランジンの発生)を直接抑えます。

【使用上の注意】

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) ぜんそくを起こしたことがある人。
- (3) 15才未満の小児。

2. 次の部位には使用しないでください

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。
- (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。

3. 連続して2週間以上使用しないでください

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感、皮下出血

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】 肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、筋肉痛、関節痛、肘の痛み(テニス肘など)、腱鞘炎(手・手首の痛み)、打撲、捻挫


【用法・用量】 表面のプラスチックフィルム(ライナー)をはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。

フィルムのはがし方



かどを指ですり合わせると簡単にがれます。

上手な貼り方



①パップの端を持ち、表面のフィルムを1/4程はがします。

②はがした一方を患部に貼り、フィルムをさらにはがしながら貼ります。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。
- (3) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭きとってから使用してください。
- (4) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

【成 分】 膏体100g(1000cm²) 中

インドメタシン……………0.5g

添加物：アジピン酸ジイソプロピル、カルメロースNa、ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート、ゼラチン、D-ソルビトール、ヒマシ油、ポリ丙烯酸部分中和物、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、マクロゴール、カオリン、酸化チタン、グリセリン、尿素、ポリソルベート80、酒石酸、エデト酸Na、メタリン酸Na、D-メントール

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 品質保持のため、開封後の未使用分は袋に入れ、開口部のチャックをきちんとしめ、外気にふれないようにして保管してください。
- (5) 使用期限をすぎたものは使用しないでください。

お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。

エスエス製薬株式会社 お客様相談室

☎ 0120-028-193

受付時間：9時から17時30分まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元

エスエス製薬株式会社

〒103-8481 東京都中央区日本橋浜町2-12-4
http://www.ssp.co.jp/

14cm×10cm **14枚入**

副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931

MEMO