00014160

2011年10月改訂（記載要領変更に伴う改訂）

【この説明書は、本剤とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。】

コレステガード®

第３類医薬品

血清高コレステロール改善薬　大豆由来成分＋天然型ビタミンE配合

- コレステガードは、コレステロール値が高い人のための医薬品です。
- 大豆油不けん化物がコレステロールの吸収を抑え、血中のコレステロールを低下させます。
- 血清高コレステロールの改善により、末梢血行障害（手足の冷え・しびれ）を緩和します。

大豆油不けん化物とは・・・
大豆を原料としたもので植物ステロールやビタミンEを含有しています。植物ステロールはコレステロールと構造が似ていて、コレステロールの小腸での吸収を抑えて血清高コレステロールを改善していきます。

⚠使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
   (1)医師の治療を受けている人。
   (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症　状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、胃部不快感、胸やけ、食欲不振、腹痛

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
   下痢、軟便、便秘
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
5. 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

Ⓡ: 登録商標

効能・効果

○血清高コレステロールの改善
○血清高コレステロールに伴う末梢血行障害（手足の冷え・しびれ）の緩和

用法・用量

次の量を毎食後に水又はぬるま湯で服用してください。

年　齢	成 人（15才以上）	15才未満
1回量	1カプセル	×服用しないこと
1日服用回数	3　回	

〈用法・用量に関連する注意〉
○用法・用量を厳守してください。

成　分　3カプセル（1日量）中

大豆油不けん化物 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 600mg
酢酸d-α-トコフェロール（天然型ビタミンE）・・・・・・・・・・・・・・・ 100mg

添加物：ゼラチン、D-ソルビトール、中鎖脂肪酸トリグリセリド、酸化チタン、グリセリン、セスキオレイン酸ソルビタン、ポリソルベート80、大豆レシチン、パラベン、エチルバニリン、三二酸化鉄、香料

保管及び取扱い上の注意

（1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にビンのフタをよくしめて保管してください。
（2）小児の手の届かない所に保管してください。
（3）他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
（4）ビンの中のつめ物は、開封後は不要となりますので取り除いてください。
（5）使用期限をすぎたものは服用しないでください。



お問い合わせ先	お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。 エスエス製薬株式会社 お客様相談室 0120-028-193 受付時間：9時から17時30分まで（土、日、祝日を除く）

製造販売元
エスエス製薬株式会社
〒103-8481 東京都中央区日本橋浜町2-12-4
http://www.ssp.co.jp/

3-3DK