



歯ぐきの腫れ・痛みなどを伴う

—— 歯肉炎に ——

飲んで効く

漢方錠

医薬品

生葉[®]

しょうよう

販売名: 生葉漢方内服薬

歯肉炎、扁桃炎

第2類医薬品



飲んで
内側から効く

84錠〈7日分〉

効能・効果 歯肉炎、扁桃炎、化膿性皮膚疾患の初期又は軽いもの
〈効能・効果に関連する注意〉 体力に関わらず、使用できる

成分・分量 1日量(12錠)中 排膿散及湯エキス2.9g〈原生薬換算量〉

キキョウ 2.0g、カンゾウ 1.5g、タイソウ 1.5g、シャクヤク 1.5g、
ショウキョウ 0.5g、キジツ 1.5g (添加物: 無水ケイ酸を含む)

添加物として、無水ケイ酸、ケイ酸Al、CMC-Ca、ステアリン酸Mg、トウモロコシデンプンを含む ●本剤は天然物(生薬)を用いているため、錠剤の色が多少異なることがあります

保管および取扱い上の注意 (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところにチャックをしっかりとめて保管すること(2)小児の手の届かないところに保管すること(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)(4)本剤をぬれた手で扱わないこと

吸湿しやすいため、服用のつどチャックをしっかりとめること

服用に際して、この説明書を必ずお読みください。
使用期限(チャック袋下部及び箱側面に記載)を過ぎた製品は服用しないこと

チャック

販売名:生葉漢方内服薬

第2類医薬品

漢方処方

内容量 84錠

For Gingivitis and Tonsillitis

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

- (1) 医師、歯科医師の治療を受けている人 (2) 妊婦または妊娠していると思われる人
(3) 高齢者 (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみなどを起こしたことがある人
(5) 次の症状のある人: むくみ (6) 次の診断を受けた人: 高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる

3. 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
5. 本剤の服用により、まれに症状が進行することもありますので、このような場合には、服用を中止し、医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

用法・用量

次の量を食前または食間に水またはお湯で服用してください

年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	4錠	3回
15才未満	× 服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

定められた用法・用量を厳守すること

●食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2～3時間のことをいいます

製品のお問合せは、お買い求めのお店またはお客様相談室にお願いいたします
(上段)使用期限(西暦年.月)/(下段)製造番号

＼あったらいいな／をカタチにする

発売元 小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

製品のお問合せ先(お客様相談室)

☎ 0120-5884-01

受付時間 9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

ホームページ <http://www.kobayashi.co.jp>

製造販売元 小林製薬株式会社
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

10127975
MADE IN JAPAN

