

【効能・効果】

体力中等度以上のものの次の諸症:感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

【成分・分量】

本品 1 日量 90mL(30mL
x3)中の成分

葛根湯エキス 8300mg

(日局カッコ内) 8.0g 日局マオウ 4.0g
日局タイウ 4.0g 日局ヒルイ 3.0g
日局シャクヤク 3.0g 日局カンゾウ 2.0g
日局ショウキヨウ 1.0g

より得た軟エキス

添加物: 白糖、1-メントール、ポリオキシエチレン
硬化ヒマシ油、安息香酸
Na、パラベン



捨てる際は、
自治体で指定
された方法で
廃棄してください。

金属: キャップ
ガラス: ピン

第2類医薬品

【使用上の注意】 服用前に必ずお読みください。

【してはいけないこと】 (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
長期連用しないでください。

【相談すること】

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください(1)医師の治療を受けている人(2)妊娠または妊娠していると思われる人(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)(4)胃腸の弱い人(5)発汗傾向の著しい人(6)高齢者(7)今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人(8)次の症状のある人:むくみ、排尿困難(9)次の診断を受けた人:高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品(箱)を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1)服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感 やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛 があらわれ、徐々に強くなる。
肝 機 能 障 害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白 目が黄色くなる)、褐色尿、全身の だるさ、食欲不振等があらわれる。

3.1ヶ月(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛)に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品(箱)を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【販売名】 イルケア葛根湯

【用法・用量】

次の量を、食間に服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1本	3回
15歳未満	服用しないでください	

【用法・用量に関する注意】

- 用法・用量を厳守してください。
- 本剤は1回1本の服用で飲みきり、飲み残しのないようにしてください。

【保管および取り扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)誤用を防ぎ、品質を保持するために、他の容器に入れかえないでください。(4)使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

●配合成分により、沈殿を生じることがあります。よく振って服用してください。

●生葉成分による沈殿物が瓶口に付着しますので、瓶を横にして保管しないでください。

【包装】 30mL×3本入(1日分)

使用期限 製造番号

製造販売元 **ドルド製薬有限公司**
岐阜県羽島市足近町1-30-1
製品に関するお問い合わせ先
058-392-6564