

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

1日1回型 みずむし・たむし用薬 第2類医薬品

アスレット[®] LX液 速乾性液剤

アスレット[®] LXクリーム べたつかないゲルタイプ

製品の特徴

多忙な現代人の生活にピッタリの1日1回塗布タイプのみずむし用薬に、かゆみと炎症を抑える成分をプラスしました。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

次の部位には使用しないでください。

- (1)目や目の周囲、顔面、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膣等)、陰のう、外陰部等
- (2)湿疹
- (3)湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 乳幼児
- (3) 本人又は家族がアレルギー体质の人
- (4) 今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人
- (5) 患部が広範囲の人
- (6) 患部が化膿している人
- (7) 「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはつきりしない人(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い)

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、熱感、ただれ、乾燥感、ヒリヒリ感

3. 2週間間隔使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持つて医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

【効能・効果】 みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

【用法・用量】 患部を清潔にして、1日1回、適量を患部に塗布してください。

【用法・用量に関する注意】

- (1) 定められた用法、用量を厳守してください。
- (2) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (3) 目に入らないようにご注意ください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5) 外用にのみ使用してください。

【成分・分量】

成 分 名	分量 (1mL又は1g中)	作 用 等
ビホナゾール	10 mg	1日1回で、みずむし菌を殺します。
リドカイン	20 mg	かゆみ、痛みを抑えます。
クロタミトン	50 mg	かゆみを持続的に抑えます。
グリチルレチン酸	5 mg	炎症を抑えます。
Lメントール	20 mg	スッとする使用感。

添加物：液 ミリスチン酸イソプロピル、マクロゴール、水酸化Na、塩酸、エタノール
クリーム ミリスチン酸イソプロピル、ポリオキシエチレンセチルエーテル、パラベン、カルボキシビニルポリマー、グリセリン、水酸化Na、塩酸

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4) 火気には近づけないでください(アスレットLX液)。
- (5) 使用期限(外箱記載)を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であってもなるべく速やかに使用してください。
- (6) メガネ、時計、アクセサリーなどの金属類、アルコール類や油脂類などで変質・変色のあるもの(プラスチック製品、化学繊維、皮革、家具、床など)への本剤の付着は避けてください。

みずむし治療のポイント

1. 清潔 患部も衣類(靴下)もこまめに洗い清潔に。
2. 乾燥 靴を脱ぐ、靴下も脱ぐ、風通し良く、よく乾燥。
3. 根気 風呂あがりの薬剤治療、痒くなくても1シーズン。

本品をご使用になられて、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記発売元までご連絡いただきますようお願いいたします。

発売元 **福地製薬株式会社**

滋賀県蒲生郡日野町寺尻824

電話 0748-52-2323

受付時間:9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元

新生薬品株式会社

富山県中新川郡上市町横越16番1

®登録商標
SNO