

この説明書は、使用前によくお読みください。
なお、使用が終わるまで大切に保管してください。

第3類医薬品

口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

コフジス うがい薬

コフジスうがい薬は、さまざまな細菌やウイルスに対して殺菌作用をもった「ポビドンヨード」を有効成分とする製剤で、のどの殺菌・消毒・洗浄ならびに口臭を除去することができるうがい薬です。

[特徴]

- ・コフジスうがい薬は、口腔内のさまざまな細菌に対し強い殺菌作用があります。
- ・コフジスうがい薬によるうがいは、口腔内の細菌も洗浄し、細菌に侵された患部を消毒します。
- ・コフジスうがい薬は、口臭や口内の不快感をとり去ります。
- ・コフジスうがい薬は、口内の粘膜を刺激せず、使用後はさわやかです。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の人は使用しないでください
本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (2) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 本剤又はヨウ素に対して過敏症の既往歴のある人。
- (4) 次の症状のある人。

口内のひどいだれ、甲状腺の疾患

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	悪心
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
アナフィラキシー様症状	胸苦しさ、むくみ、じんましん、発疹等があらわれる。

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

【効能・効果】

口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

【用法・用量】


1回、本剤2～4 mLを水約60 mLにうすめて、1日数回うがいしてください。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
うがい液をはきだせない年齢の小児には使用させないでください。
- (3) うがい用にのみ使用し、内服しないでください。
- (4) 本剤は使用する時にのみ希釈し、うすめた液は、早めに使用してください。
- (5) 使用法

うがいの仕方

キャップをあけて容器をさかさに持ち、指でゆっくり押して本剤2～4 mL（添付の計量コップを斜めにして、2～4 目盛）をとり、約60 mL（計量コップを水平にもどし目盛60）の水でうすめて、ていねいにうがいしてください。



【成分・分量】

1 mL中 ポビドンヨード…………… 70mg

（有効ヨウ素 7 mg含有）

添加物として、ヨウ化K、*l*-メントール、D-ソルビトール液、サッカリンナトリウム水和物、グリセリン、アルコールを含有します。

＜成分・分量に関連する注意＞

本剤の使用により、銀を含有する歯科材料（義歯等）が変色することがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 誤用をさげ品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- (4) 薬液が衣類に付着した時は、すぐに水または洗剤で洗ってください。落ちにくい場合にはチオ硫酸ナトリウム（ハイポ）で洗ってください。
- (5) 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。
- (6) 添付の目盛り付きコップはご使用のつど、水洗いなどして常に清潔に保管してください。

本剤をご使用になられて、何かお気付きの点がございましたら、下記までご連絡頂きますようお願い致します。

福地製薬株式会社

TEL：0748-52-2323

受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）