

この説明書は、使用前によくお読みください。
なお、使用が終わるまで大切に保管してください。

鎮痒消炎薬

サンシップリニメント

第3類医薬品

あせも、かぶれ、湿疹などの皮膚病は日常よく見られますが、かゆみや発赤が強い場合は無意識のうちに掻きむしってしまい、さらに悪化させてしまいます。
その症状の悪化をおさえ、保護する作用をもっているのがサンシップリニメントです。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
 - 医師の治療を受けている人。
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 湿潤やただれのひどい人。
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
 - 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
 - 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

【効能・効果】

あせも、かぶれ、かゆみ、ただれ、湿疹、皮膚炎、しもやけ、虫さされ、じんましん

【用法・用量】

1 日数回適量を患部に塗擦してください。

＜用法・用量に関連する注意＞

- 用法及び用量を厳守してください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 外用にのみ使用し、内服しないでください。

【成分・分量と作用】

100 g 中

成 分	分量	作 用
ジフェンヒドラミン	1 g	抗ヒスタミン作用により、湿疹、皮膚炎、かぶれなどをおさえ、また、かゆみを止める作用もあります。
酸化亜鉛	15 g	分泌物を吸収し、乾燥させることにより患部の保護、治癒を助けます。
l-メントール	0.5 g	おだやかな局所冷感刺激作用でかゆみをおさえます。
dl-カンフル	0.5 g	

添加物として、グリセリン、ステアリアルアルコール、ラノリン、セタノール、プロピレングリコール、流動パラフィン、ミツロウ、ポリオキシエチレンラノリン、ベンザルコニウム塩化物液、ソルビタンセスキオレイン酸エステル、ポリソルベート80、ポリオキシエチレンオレイルエーテル、スクワラン、パラベンを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手のとどかない所に保管してください。
- 誤用をさけ品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

本剤をご使用になられて、何かお気付きの点がございましたら、下記までご連絡頂きますようお願い致します。

福 地 製 薬 株 式 会 社

T E L : 0748-52-2323

受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）

製造販売元

福地製薬株式会社

滋賀県蒲生郡日野町寺尻824