

ビタミンC錠「FS」

第3類医薬品

— 1日量ビタミンC2000mg含有 —

ビタミンCは体内で欠乏すると、貧血、食欲不振、疲れ、病気に対する抵抗力が低下するなど、体力保持のための必須のビタミンです。

しかも、ビタミンCは、食物から補給する以外に、人の体内で作り出すことができません。血行をよくし、しみ、そばかす、日やけ・かぶれにもよく効き、また、加齢による体力低下の回復などにも本剤をご愛用いただき、健康の維持、増進にお役立てください。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
皮膚部に発疹・発赤、かゆみ、消化器に吐き気・嘔吐
- 2.服用後、下痢の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 3.1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

●成分・分量（1日量成人6錠中）

アスコルビン酸 …………… 1,400mg アスコルビン酸カルシウム
リボフラビン酪酸エステル …………… 6mg （アスコルビン酸として600mg）…………… 726mg
添加物として、乳糖水和物、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースCa、ステアリン酸Mg、アスパルテーム（L-フェニルアラニン化合物）、グリチルリチン酸二カリウムを含有します。

●用法・用量

15歳以上 …………… 1回1～3錠 7歳以上11歳未満 …………… 1回1錠
11歳以上15歳未満 …………… 1回1～2錠 1日2回 食後に服用してください。
小児に服用させる場合には、保護者の監督のもとに服用させてください。

●効能

次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着
次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻出血
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は医師、薬剤師又は歯科医師に相談してください。」
次の場合のビタミンCの補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光をさけ、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- (4) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

発売元 福地製薬株式会社
滋賀県蒲生郡日野町寺尻824

副作用被害救済制度 TEL 0120-149-931

製造販売元 米田薬品工業株式会社
奈良県高市郡高取町市尾986

本品について お客様相談室 TEL0744-52-3720
のお問合せ先 月～金曜日 10:00～16:00(祝祭日、特定日を除く)