

この説明書は、ご使用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

プラセンター軟膏 [外皮用薬]

第2類医薬品

パルモア[®]

パルモアは、新鮮な動物胎盤からの抽出物プラセンターリキッドと、ピリドキシン・ジバルミテート（脂溶性ビタミンB₆）を配合した皮膚の新陳代謝を高める軟膏です。

本剤は進行性指掌角皮症などの角化性疾患や湿疹、皮膚炎に効果をしめすほか、皮膚の栄養や保護にも使用できる、応用範囲の広い軟膏です。

 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人または家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 湿潤やただれのひどい人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 数日間使用しても症状の改善がみられない場合。

効能・効果

進行性指掌角皮症、脂漏性皮膚炎、湿疹、皸糠疹、日光皮膚炎、口唇炎、にきび、酒皰、皮膚の栄養及び保護、肌あれ、口唇乾燥症、口唇き裂、その他の皮膚乾燥及び角化症

用法・用量

通常1日2～3回、適量を患部に塗布または塗擦してください。必要によりガーゼなどに塗布し、患部に貼用してください。

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 用法を守ってください。
- (2) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。

(裏面につづく)

- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療をうけてください。
- (5) 外用にのみ使用し、内服しないでください。

■ 使用時のアドバイス ■

1. 症状によっては、就寝時などに、本剤を十分に塗布した後、ガーゼを当て、木綿の手袋、靴下、マスクなどで固定しますと効果的です。

■ 成分と働き ■

100g中に次の成分を含んでいます。

成 分	含 量	働 き
プラセンターリキッド	5g	皮ふの新陳代謝を高め皮ふを保護し、うるおいをあたえます。
ピリドキシン・ジパルミテート	1g	脂溶性のビタミンB ₆ で皮ふに栄養をあたえます。

(油脂性軟膏基剤)

添加物としてパラベン、リノール酸エチル、グリセリン、セトステアリルアルコール、ラウリル硫酸Na、ワセリンを含んでいます。

■ 保管及び取扱い上の注意 ■

- (1) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (2) 直射日光の当たらない、涼しい所に密栓して保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- (4) 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。また開封後は使用期限内であってもなるべく速やかに使用してください。



■ お問い合わせ先 ■

本剤のご使用により、何か変った症状があらわれるなど、お気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

三宝製薬株式会社 お客様相談室 電話03-3952-0100
月～金曜日 9：00～17：00（祝祭日を除く）

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931



製造販売元
三宝製薬株式会社
東京都新宿区下落合2-3-18