

使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

あせもローション 桃の葉の薬

MOMONOKA MEDICAL LOTION

第2類医薬品

「**桃の葉の薬**」は昭和24年に根岸長三郎氏によって研究開発された商品で、その名前が示す通り“**桃の葉**”から主成分が抽出されています。本品はあせもや皮膚炎症に古くから用いられてきた民間療法「**桃の葉の行水療法**」をヒントに開発された医薬品です。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
 - 医師の治療を受けている人。
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - 薬によりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人。
 - 湿潤やただれのひどい人。
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
 - 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

その他の注意

- 衣類、カーペット等につきますと着色しますので、注意してご使用ください。（衣類についた場合は、すぐに水又は洗剤でよく洗い落としてください。）
- 薬剤が床や洗面台、家具、革製品、化成品等に付着しないように注意してください。（変質又は変色のおそれがあります。）

【効能・効果】

あせも、ただれ、かぶれ、かゆみ、虫さされ、吹出物、にきび、かみそりまけ

【用法・用量】

1日1～数回適量を患部に塗布するか、ガーゼ等のにばして貼付してください。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用のみに使用し、内服しないでください。

【成分・分量】 103.55 g 中

桃の葉	2.00 g	)の浸出液	100.00 g	エタノール	0.50 g
キョウニン	5.00 g			グリセリン	0.50 g
硫酸アルミニウムカリウム	2.00 g			サリチル酸メチル	0.05 g
レゾルシン	0.50 g			添加物として香料(ユーカリ油)を含有。	

＜成分に関連する注意＞

本剤は生薬が配合されていますので、まれに沈澱を生じることがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用を避け、品質を保持するために、他の容器に入れ替えないでください。
- (4) 品質保持のため、使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、キャップを一度開けた後は、できるだけ早めに使用してください。

【内容量】 100 g

【お問い合わせ先】

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いいたします。

千金丹ケアーズ株式会社 お客様相談室

電話：(087) 874-5500 受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)