

この添付文書は服用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。



便秘薬

第②類医薬品

腸草薬

便秘になると腹部膨満、頭痛、のぼせなどの不快な症状があらわれたり、また肌あれ、吹出物、痔などの原因になることがあります。

「腸草薬」は大腸のぜん動運動を促し、おだやかな便通をもたらす和漢生薬を主体とした緩下薬です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないで下さい。
他の瀉下薬(下剤)
2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい。
3. 大量に服用しないで下さい。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 本人又は家族がアレルギー体質の人
(4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
(5) 次の症状のある人
はげしい腹痛、悪心・嘔吐
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、悪心・嘔吐

- (2) 1週間位服用しても症状がよくならない場合
3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。
下痢

効能・効果

- 便秘
- 便秘に伴う次の症状の緩和:
頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振、腹部膨満、腸内異常発酵、痔

用法・用量

下記用量を一日一回就寝前に服用して下さい。

	2～3日便通がないとき	4日以上便通がないとき
大人(15歳以上)	2～3錠	4～5錠
11歳以上15歳未満	1～2錠	3～4錠
11歳未満	服用しないこと	

ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量してください。

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

〈成分・分量に関連する注意〉

- (1) 本剤の服用により、尿が橙色ないし赤色をおびることがあります。これは、本剤中のダイオウ末等によるもので心配ありません。
- (2) 本剤は、生薬を配合した製品ですから、製品により錠剤の色が多少異なることがあります。効果には変わりありません。

〈用法・用量に関する注意〉

錠剤の取り出し方

下図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。

(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に)
突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



成分とはたらき

成 分	分 量 (5錠中)	は た ら き
ダ イ オ ウ 末	300mg	有効成分が腸の動きを活発にし、 排便を促します。
セ ン ナ 末	500mg	
ア ロ エ 末	300mg	
ケ イ ヒ 末	90mg	胃腸機能を亢進し、食欲不振などを 改善します。
カンゾウエキス末 (カンゾウ350mgに相当)	50mg	ダイオウ末の働きを助けるとともに、 腸管内の水分を保持します。

添加物として、無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、マクロゴールを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの販売店又は
下記までご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

長野県製薬株式会社 お客様相談室

 0120-100-975

受付時間:土・日・祝日及び弊社休業日を除く 午前9時～午後5時

発売元



長野県製薬株式会社

長野県木曽郡王滝村此の島100-1

製造販売元

国産薬品工業株式会社

岐阜市秋沢370-2