

2009年1月改訂

第 2 類
医 薬 品

ご使用に際してこの説明書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管して下さい。

あせも・かゆみ・ただれ

登録 **ヒフカA**® 商標

ひふ炎・湿疹・蕁麻疹

赤ちゃんは勿論 パパもママもどうぞ！

ヒフカAは使いやすい薬用液状ボーダーです。

ヒフカAは皮膚病になりやすい暑い季節には、大変便利な常備薬です。
汚れやすく、細菌に弱い赤ちゃんの皮膚にも好適なあせも、湿疹、
かゆみの治療薬です。

特 徴

天然成分あんず抽出物を配合し、肌にやさしく、赤ちゃんからお年
寄りの方、皮膚の敏感な方まで幅広くお使いいただけます。ひんやり、
さらとしたつけ心地で、乾きも早く、べとつきません。



使用上の注意



してはいけないこと

〔守らないと現在の症状が悪化したり
副作用・事故が起こりやすくなります〕

1. 本剤は外用剤ですから、内服しないでください。

相談すること



1. 次の方は使用の前に医師又は薬剤師にご相談ください。
- (1) 医師の治療を受けている方
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の方
 - (3) 今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状（例えば発疹・
発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある方
 - (4) 湿疹やただれのひどい方
2. 次の場合は直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬
剤師にご相談ください。
- (1) 使用後、発疹・発赤、かゆみ、はれ等の症状があらわれた場合
 - (2) 5～6日間使用しても症状の改善がみられない場合や、本剤の
使用により症状が悪化(病巣が使用前より広がる等)した場合

効能又は効果

あせも、かゆみ、湿疹、ただれ、ひふ炎、じんましん、かぶれ

用法及び用量

1日数回患部を清潔にして適量を塗布して下さい。

＜用法及び用量に関連する注意＞

- (1) 定められた用法及び用量を守って下さい。
 - (2) 小児に使用させる場合には保護者の指導監督のもとに使用させて下
さい。
 - (3) 目に入らないように注意して下さい。万一目に入った場合にはすぐ
に水又はぬるま湯で洗って下さい。なお症状が重い場合には眼科医
の診断を受けて下さい。
 - (4) 極めてまれに化粧品や薬品にカブレやすい特異体質の方がいます。
このような方は、少量を皮膚のやわらかい部分につけて異常がおこ
らないか確かめてからご使用下さい。
- ◎容器のキャップをつけたまま、よく（容器内の玉がコトコトと鳴るまで）
振り動かし、キャップをとり乳白状の液が出ることを確認してから、
先のボールをころがすようにして、皮膚に塗布して下さい。
- ◎容器中の玉は溶液を攪拌するためのもので、薬効には全く関係ありま
せん。
- ◎長期間保存された場合、容器を充分振り動かしてから御使用下さい。

成分及び分量

成分（100mL中）

	β-グリチルレチン酸……………0.4g
	アンズオール……………8.0mL
日本薬局方	酸化亜鉛……………6.0g
“	フェノール……………1.0g
	添加物：パレイショデンブ、タルク、 炭酸マグネシウム、ベントナイト、 エタノール、水酸化ナトリウム

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光をさけ、涼しい所に密栓して小児の手のとどかない所に保
管して下さい。
- (2) 誤用をさけ品質を保持するため他の容器に入れかえないで下さい。
- (3) 御使用後はキャップをかたくしめて保管下さい。液もれの原因と
なります。
- (4) まれにキャップ内側やボール部分等に付着した液が赤くなること
がありますが品質に問題ありません。
- (5) ヒフカAはお使いになりますと肌に成分の一部が白く残ります。
これは有効成分「酸化亜鉛」によるものです。
- (6) 外箱底面記載の使用期限は未開封の場合の期限です。
また、使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

製造販売元

松田医薬品株式会社
高知県南国市左右山ヒル沢谷229-1
URL <http://www.matsudaiyaku.co.jp/>
E-mail info@matsudaiyaku.co.jp

お問い合わせ先

松田医薬品株式会社 南国工場
消費者相談窓口
電話 088-862-1666
受付時間 9:00～17:30
(土、日、祝日を除く)

改訂箇所：医薬品区分

S001